

зание-то пуца една водна материя що лѣпни, и гората на струпѣи-тѣ като падне, незабавно се съставлява пакъ. Обикновенно изривание-то се нахожда по брадата и задъ ушитѣ. — **Ешаръ**, когато изривание-то се развлича подъ видъ на малки прищипици. — **Ликон.**, когато изривание-то е вонѣщо и пуца лесно кръвъ. — **Мерк.**, подобава на дѣтца-та що вѣнци-тѣ имъ се скорбутически и когато лиги-тѣ имъ текжтъ. — **Русъ**, ако изриванието е забиколено отъ единъ червенъ валекъ и распаленъ съ силенъ схрбежъ — най паче нощѣмъ. Сливизи-тѣ подъ брада-та и по врата-тъ съ подутти, и тила-тъ стои като спѣпенъ. — **Суло.** когато изривание-то се раздава малко по малко по сичката снага, и причини на болния-тъ единъ силенъ схрбежъ. Когато изривание-то е отъ прищипици които докарватъ единъ силенъ схрбежъ, и пуцатъ кръвъ щомъ ги разчешжтъ.

Излишно е да казваме че тѣзи лѣкарства подобаватъ и по други мѣста на тѣло-то, стига признаци-тѣ да сж подобни.

Лѣкарства-та ще са даватъ 2 или 3 пхтя въ день съ продълженме на 3 или 5 дни; послѣ едно спирание отъ подобно време, и ако би злото, вмѣсто намалявание, се обсили, то лѣкарство-то трѣба да се повтори.

ЗАБѢЛ. — Херингъ за млѣчни-тѣ пжжи по дѣтца-та, рекомандува слѣдуѣщи-тѣ лѣкарства: **апон.** № 12 (6 зр. въ 8 лжжици вода) отъ четири на четири часа,