

териа. — Въ начало дай: **нулс.** N^o12 или 30 (7 зр. въ 40 др. вода) по една лъжица сутрѣна и вечеръ ако рана-та е скорошна; ако тя е хроническа, дай по една лъжица ката сутрѣна прѣзъ день. Щомъ развлѣчение-то на жили-тѣ изчезне, и вхтрѣшность-та измѣни синкавиа-тѣ си цвѣтъ, то дай: **калк.** N^o30 и **сулф.** N^o30 (7 зр. въ 30 др. вода) въ размѣна на сѣки три дни по една лъжица сутрѣна и вечеръ.

2) Живиничеви рани. — Рани съ подутие кораво, краища не равни и корави; кожа-та наоколо бива червеникава или синкава. Рѣдко е що кость-та да не бѣде тоже подута, или сливици-тѣ що се нахождатъ наоколо. Тѣ като не даватъ никакви болки, пуцатъ единъ гной като сурватка. — Дай **калк.** и **сулф.** както по горѣ казахме за рани-тѣ отъ развлѣчение на сини-тѣ жили.

3) Скорбутически рани. — Тѣ сж подутие на околности-тѣ, съ краища синкави или червеникави; рана-та пуца сжкръвица и е покрита отъ израсло мясо що пуца лесно една черна и вонѣща крхвъ. Изъ начало употреби лѣчение-то на скорбута (вишь скорбуть); послѣ дай **калк.** и **сулф.** както по горѣ.

4) Рана съ фистула. — Тя са познава отъ това че се сжхранява отъ единъ фистуленъ каналъ, или отъ едно растворено мѣсто на кожа-та; гнойа-тѣ е вжобще не добхръ. — **Силнс.** N^o30 (7 зр. въ 40 др. вода) по една лъжица ката сутрѣна или