

ката три дни. Щомъ са забѣлѣжи че фистула-та начне да се затваря или се затвори, то послѣ вмѣсто **силне.** дай : **калк.** и **сулф.** както по горѣ.

5) Гѣбовидни рани. — Рани съ израстнаго подутие, кое-то е мѣко, червено или синкаво съ болки силни или безъ болки, и кое-то отъ най малко-то докачение пуца крхвъ. — Дай **карб.-веж.** №30 (7 зр. въ 40 др. вода) по една лъжица сутрѣна. Четири дни подирѣ свършване-то на това лѣкарство, дай **калк.** и **сулф.** както казахме.

6) Рачена рана. — Вжтрѣшността на раната е корава; краищата му неравни и корави; вжобще той е на издатки като мами, и има цвѣтъ бѣлочервеникхвъ или белотеменъ; гной-тъ му бива вонѣщъ и не добжръ, и по причина на своя-та лѣтостъ яде често околни-тъ мѣста. Образа-тъ на раната е вжобще валчасть, съ силни болки и влѣче сѣкоги да се разширочава. — Дай **арс.** и **лаш.** №12 или 30 (7 зр. въ 40 др. вода) въ размѣна сѣка сутрѣна по една лъжица ако рака-тъ е ескрошенъ, или сѣки три деня по една лъжица сутрѣна и вечеръ, ако той е отъ давно. Една седмица послѣ свършване-то на горнитѣ лѣкове, дай **калк.** и **сулф.** както казахме по горѣ.

Ако раната се нахожда врхъзъ глезена-тъ на крака-та, то ако се нахожда схвременно и развлѣчение на сини-тъ жили, дай **пулс.** Послѣ дай : **са.-флуор.** №12 (6 зр. въ 30 др. вода) по една