

пукс.-в. и послѣ **антим., пулс., сулф.**—Подиртъ дръхивание-то на едно кожно изривание или на една рана: **сулф., калк.**—По слѣдствие на еморроиди: **пукс.-в., сулф.**

При горни-тъ общи забѣлѣжки ние ще прибавимъ йоще и слѣдуѣущи-тъ: когато залѣса-тъ произхожда отъ едно движение и се намалява като си лѣгне болниа-тъ, изисква се: **ини.**;—този що произхожда като си лѣгне: **русь**;—като става: **хамом.**;—като сѣда: **пулс.**;—като се навежда: **акон.**, заподиренъ отъ **белл.** или **калк.**;—подиртъ едно умствено напръгвание: **пукс.-в.**;—съ притемнѣвание на очи-тъ, най паче вечеръ: **мерк.**;—подиртъ едно приадание: **арн.** или **пулс., пукс.-в., хамом., русь**;—съ изчезвание на чувства-та: **белл.**;—ако той е тѣжъ силенъ щото болниа-тъ пада и се нахожда въ опасностъ да не умре: **русь**.

Кръвостечение вѣмъ мозака-тъ. (Congestion)

То произхожда или отъ една силностъ на кръвта, или отъ една немощъ; слѣдователно то бива *силно* или *немошно*. Това страдание на глава-та се упознава по червенина-та на лице-то, по подутие-то на вѣнкашни-тъ сини жили, по отбивание-то на вѣгрѣшни-тъ. Болниа-тъ чувствува хучение на уши-тъ, залѣсъ на глава-та, притемнѣвание на очи-тъ, като че глава-та му е пълна съ нѣщо. По нѣкоги, въ по силна степенъ, болниа-тъ може да изгубе всяко чувство и движение, послѣ кое-то може да се случи и нѣкоя парализа.