

тискание-то на кое то запослѣдва изгубване-то на умственни-тѣ сили, на чувство-то и на движение-то въ нѣкои части. Понѣкоги то бива внезапно; понѣкоги то има като прѣдварителни знакове: залѣсъ притемнѣвание на очи-тѣ, тѣгостъ на главата, и пр.

Лѣчение.— Първо-то нѣщо що трѣба да се извърше по скоро на единъ подобенъ болѣнъ, то е да се раслаби и схлѣче, и да се постави въ едно лѣгло щото кръвообращение-то да става свободно. Послѣ да му се удари единъ глистиръ (фокна) отъ солена вода, и да му се поставѣтъ парцали съ студена вода по чело-то, по гърди-тѣ и по корема-тѣ — и синанисми (хардалъ) по крака-та.

Подиръ това ако пулса-тѣ е твърдъ, силенъ и бързъ, дай **акон**. Тоже дай **акон.**, ако случката е подиръ едно уплашване, едно разгнѣвяване. — Ако болния-тѣ е нженъ съ лице червено, дай **белл**. — На пианци-тѣ и стари-тѣ хора съ пулсъ медленъ и лице червено: **он**. — Съ пулсъ слабъ и брѣзъ и лице синкаво и блѣдо: **лаш**.

Лѣкарството що подобава ще се дава отъ едно долно нумеро (3—6) прѣзъ $\frac{1}{2}$ или единъ часъ, до дѣто болния-тѣ дойде въ себя си. — Когато запослѣдва парализиа, най сгодни-тѣ лѣкове сж: **арн.** и **кокк**. стъ нумеро по горно (12—30) и съ даване въ расстояние по рѣдко. — Кръвопускане-то е единъ способъ не сгоденъ; то повѣче-то ускорява смъртта.