

(въ такъвъ случай полезенъ е тоже **под**) — Ако подутие-то е подъ едно расположение ревматическо или живиничево, а най-паче ако то произхожда отъ едно смущение на нервическата система, като на брусница-та, то подобава **русъ**. — Когато подутие-то клони да набере, то дай **мерк.**; послѣ кое-то, ако се бави да докара подобрѣние, дай **е-наръ-с**. — Ако разнасение-то отива медленно. и ако болния-тъ е живиничевъ, дай: **сипше**. — Ако болка-та се прѣмѣсти въ мждо-то: **шуле. N°12**; на утрѣшния-тъ день дай **мерк. N°30** (5 зр. въ 8 лжж. вода — прѣзъ 4-три часа по една лжица) и послѣ **суло**. по сжщия-тъ начинъ. — Кога-то подутие-то не се разнася, или когато то изчезне съ страдание послѣ на желудка-тъ, и съ една медленна трѣска: **карб.-вж.** — Ако **карб.** не сполучи на медленна-та трѣска, то дай **кокул.** — Когато трѣска-та е силна: **белл.** и, 36 часа послѣ: **поск.**.

Распаление на външното ухо.

Признаци-тъ на това распаление сж: червенина, горѣщина, болки и подутие на ухо-то. Ухо-то по нѣкоги се затваря схвсѣмъ, и болки-тъ ставатъ тѣй силни щото болния-тъ едвамъ може да ги тхрпи: щрѣкание, цѣпение, отбивание и горѣщина; дору болния-тъ понѣкоги изгубва себя си.

Лѣчение. — Първо-то лѣкарство що подоба-