

но ако има бжлнувание и силно главоболне, то по-добава **белл.** — Ако тѣзи двѣ лѣкарства не сж достаточни да надвнѣтъ распаление-то щото гнойнѣтъ да протече, то може йоще да се употрѣбжтъ: **енар.**, **мерк.**, **силне.** или **сулф.** въ това отношение. — Щомъ распаление-то испадне и остане само течение-то, то употрѣби **пулс.** въ размѣна съ **сулф.** № 30 по една лжжица сутрѣна и вечерь (единъ день отъ едно-то, другъ отъ друго-то). — Ако тѣзи двѣ лѣкарства, въ расстояние на една седмица, не докаратъ никакво подобрѣние, то дай: **мерк.-в.** и **енаръ** № 30 по сжщия-тъ начинъ. — Ако въ гнойно-то течение се появжтъ части отъ кость или хрущелъ, дай; **аур.** № 12 по една лжжица сутрѣна и вечерь. — Ако подиръ 15-е дни на това лѣкарство, гнилость-та на тѣзи части не се подобри, то дай **силне.** № 30 по сжщия-тъ начинъ. Сжвременно отъ сжщо-то лѣкарство може да се испромива (чрѣзъ една сиринга или толумба) сутрѣна и вечерь уxo-то; това ускорява подобрѣние-то.

ЗАБѢЛ Не трѣба да изгубваме отъ видъ свойството на гнойно-то течение, както и негова-та причина: — Ако течение-то е водно и мѣза като на калъ-та на уxo-то: **кон.**, **мерк.**; — ако то е слuzесто или като саполъ: **мерк.**, **пулс.** или: **калк.**, **ликон.**; — ако то е гнойдиво: **пулс.**, **силне.** или: **калк.**, **ликон.**, **мерк.**; — когато е кжрваво: **калк.**, **мерк.**, **нитр.-ас.**, **пулс.**, **сулф.**; — водно или влажно: **кауст.**, **мерк.**, **нитр.-ас.**; Подиръ лещенка-та: **пулс.** или **сулф.**; — подиръ брус-