

нощъ, къмъ схмивание, и послѣ пладнѣ. — **Суло.**, ако болка-та е отъ лѣвата страна съ зазлѣвание вечеръ и прѣди ерѣднощъ. — **Дулк.**, когато болка-та зазлѣва като болниа-тъ почива, най-паче нощѣмъ; когато на болниа-тъ се подига, и болки-тѣ сж слѣдствие на една простудка; когато болка-та е на лѣво съ главоболие и гърлоболіе.

Хучение на уши-тѣ.

Този признакъ се присхединява обикновенно съ гнойното течение на уши-тѣ, ухоболіе-то или съ глухота-та; по нѣкоги то е слѣдствие на едно главоболие, на едно напръгвание на кръвь-та къмъ мозака-тъ. Въ такива случаи трѣба да се употреби това лѣкарство що подобава на болѣсть-та отъ която то зависи.

Лѣчение. — Ако то е слѣдствие на една простудка: **пукс.-в.**, най-паче ако то е по силно сутрѣна. — Ако то е по силно вечеръ: **пуле.**; — нощѣмъ: **дулк.**. — Ако болниа-тъ не може да се испоти: **хамон.**

Въ подобенъ случай йоще може да бждѣтъ полезни лѣкарства-та: **аммон.**, **белл.**, **граф.**, **натр.-мур.**, **суло.**, **арн.**, **калк.**

Глухота.

Глухота-та обикновенно зависи отъ други болѣсти, които додѣто не изчезнѣтъ, тя не прѣмину-