

течение-то е слѣдствие на една горѣщина, на едно кржвостечение къмъ глава-та, съ главоболие, лице и очи червени (ката $\frac{1}{2}$ или 1 часъ по една малка лжжичка); **брион.** често бива нужна по-диръ **акон.** — **Русъ** подобава когато кржвотечение-то дохожда нощѣмъ, или когато се наведе или прѣсили болниа-тъ. — **Шуксъ-в.** подобава, когато кржвотечение-то е слѣдствие на едно пианство, на едно твѣрдо занятие или безсжние. — **Шипа** подобава на хора безсилни, изнеможени и блѣди. Ако тя сама не е достаточна да сире кржвъ-та, то дай я въ размѣна съ **карб.-вж.** — **Кон.** подобава когато кржвотечение-то дохожда като кихне болниа-тъ. — **Брокусъ,** когато кржвъ-та е гжста и черна. — **Мерк.,** когато кржвъ-та се спихтийва въ нос-а-тъ, и запушва дупки-тъ. — **Кокул.** и **сени.** подобаватъ на тѣжки-тъ жени, и на хора що се расположены на еморроиди. — Ако кржвотечение-то дохожда периодически, то е отъ време на време, дай **арн.** № 6 или 12 прѣвъ 4-три часа по една малка лжжичка. — Ако това лѣкарство не испжлне цѣль-та си, то дай **фосф.** № 12 по сжщия-тъ начинъ. — Когато кржвотечение-то се продължава и е довольно изобилно, то дай, въ размѣна, **арн.** и **фосф.** (ката $\frac{1}{2}$ часъ по една малка лжжичка). — Когато горѣказани-тъ срѣдства не сполучжтъ, то дай, въ размѣна, **цинк,** и **сулф.** № 12 сѣки $\frac{1}{4}$ или $\frac{1}{2}$ часъ, ако положение-то на болниа-тъ е зло; ако ли кржвотечение-то е леко, то отъ три часа на три.