

Лъжлива загърлица или задушителна астма на миллара.

Тая болѣсть се отличава отъ по горня-та въ това че тя не е тѣй опасна. Тя дохожда всякога извѣднѣжъ и обикновенно нощѣмъ, и щомъ припадока-тъ прѣмине, дѣте-то бива почти въ нормално положение; припадоци-тѣ дохождатъ отъ време, и биватъ или съдружени отъ една малка трѣска или съвсѣмъ лишени; тя бива сѣкоги спорадическа, коги точна-та загърлица е повѣчето епидемическа; тя не вѣди ципи, както по горня-та, и кашлица-та ѝ бива суха, ясна безъ хрчка.

Лѣчение. — Спорѣдъ доктора-тъ Теста двѣ лѣкарства сѣ достаточни обикновенно за да я излѣчатъ: **корал-руб.** №30 и **оп.** №3. Дай тѣзи двѣ лѣкарства въ размѣна сѣки 10 минути въ време на припадока-тъ; а сѣки два часа, щомъ припадока-тъ прѣмине, по една малка лъжичка. Щомъ припадоци-тѣ прѣстѣлѣтъ да дохождатъ то дай **оп.** само ѳоще два дѣня по една лъжичка сутрѣна и вечеръ.

Хроническо положение на грѣклана-тъ.

Тая болѣсть не е друго освѣнъ прѣгракване-то въ хроническо състояние. Гласа-тъ е разваленъ,