

риодъ, по една лъжица сутрѣна и вечеръ. (Това лѣкарство подобава йоще когато дѣте-то зазлѣва най-паче посрѣдъ нощъ, и когато сжществува силна трѣска; когато припадоци-тѣ на кашлица-та сж силно спазмодически съ задущаванне; често се случва кржвотечение отъ носа-тѣ и отъ устата). Шестъ деня послѣ свжршване-то на това лѣкарство, ако сжществува подобрѣние, повтори го; ако ли не, дай **корал.-р.** №30 (7 зр. въ 40 др. вода) четири деня наредъ по три лъжици въ день. (Това лѣкарство подобава йоще кога-то припадоци-тѣ на кашлица-та сж твжрдѣ силно спазмодически, особно кжмъ вечеръ. Щомъ подобрѣние-то що е произвело това лѣкарство, арнише да дѣйствува, дай **хемид.-м.** №6 (7 зр. въ 40 др. вода) по една лъжица сутрѣна и вечеръ. Това лѣкарство ще се продължава додѣ-то кашлица-та отъ спазмодическа се измѣни въ хрѣмава. Ако би въ неговото продължение кашлица-та начне да дохожда силно спазмодически, то дай пакъ **кор.-р.**, както казахме по горѣ, и продължававай додѣто тя се измѣни въ проста хрѣмава. — Щомъ това измѣнение стане, дай **шулс.** (7 зр. въ 40 др. вода) по една лъжица сутрѣна и вечеръ.

Когато въ втория-тъ периодъ, дѣте-то (пжлно-кржво и русо) въ време на кашлица-та или нощѣмъ се поти, ходение-то му по вжнѣ е много малко раслабено; или когато, на сѣки припадокъ, гржклана-тѣ се стѣснява тжй щото дѣте-то посинява и