

чешжтъ често носа-тъ; тѣ се сцѣняватъ въ време на припадока-тъ, и ядѣтъ твѣрдѣ много. Дай **сина** най-паче на тѣзи що сѫ каприциозни и чернооки (белл. подобава на дѣтца кротки, чувствителни и русокоси). — **Кониумъ**, когито припадоци-тъ на кашлица-та особно дохождатъ нощѣмъ. — **Куир.-м.** въ време па сѣки припадокъ дѣте-то се сцѣнява тжѣ като че е умрѣло. — **Дулк.** ако болка-та зазлѣва когато време-то отъ топло стане студено, или ако дѣте-то се е простудило отъ студенъ и влаженъ воздухъ. — **Фер.** на сѣки припадокъ дѣте-то бжива що е яло. — **Моск.** кашлица-та зазлѣва като си лѣгне дѣте-то; тя наималява като се исправи и сѣдне. — **Кали-к.** подутие мѣжду вежди-тъ и клепачи-тъ. — **Лапи.** кашлица-та дохожда съкоги подиръ едно спание; дѣте-то е болнакаво и твѣрдѣ слабо. — **Мерк.** дѣте-то се поти много нощѣмъ, и на сѣки припадокъ му дохожда крхвь отъ носа-тъ и отъ уста-та. То има два припадока денѣмъ или нощѣмъ. — **Нукс.-в.** суха кашлица коя-то се умножава подиръ 4-три часа утромъ, сѫдружена отъ запоръ. Лице-то посинява; крхвотечение отъ носа-тъ и отъ уста-та. — **Фисф.** силно прѣсипваніе на гласа-тъ, дору сжвсѣмъ изчезнатъ по слѣдствие на кашлица-та. — **Нулс.** клюста кашлица съ бжльочъ и дрисжкъ, кой-то се умножава нощѣмъ. — **Сени.** кашлица-та се удвоява утромъ; тя е клюста, и се оталожва съ подиганіе. — **Силис.** прѣкрасно лѣкарство за дѣтца що страдатъ отъ глисти, когато **сина** не е имала добра сполучка. — **Сулф.** когато кашлица-та се повржда често безъ да може да й се узнае причина-та; дай го тоже на живиничеви-тѣ дѣтца що иматъ една суха и прѣсъчена кашлица, съ задавляние. — **Скилл.** дѣте-то като кашли, киха. Сжлзотечение отъ очи-тѣ и водотечение отъ носа-тъ, Въ време на кашлица-та, дѣте-то си трие непрѣстанно носа-тъ очи-тѣ и лице-то.