

Освѣнь кауст., дрост., кали-к., мерк., фосф.
сени., силис. и сулф. дѣто ще са даватъ сутрѣна и
 вечеръ до три дни, и послѣ да имъ се чака добро-то
 слѣдствиye, ако има подобрѣниe, сички-тѣ други, отъ го-
 рѣказани-тѣ лѣкарства, ще се даджтъ въ продлженіе
 на много дни по 3 или 4 малки лжички въ день.

Когато се сполучи точно-то лѣкарство, то йоргажа-
 та, що се продлжава обикновенно отъ 16 до 25 недѣ-
 ли, ще има едно продлженіе много по кратко, и нѣма
 да биде никога тѣй силна щото да постави въ опас-
 ность животъ-та на дѣте-то.

ГЛАВА VIII.

БОЛѢСТИ НА ГЖРДИ-ТѢ.

Распаление на гржклана-тѣ и на негови-тѣ кло-
 нове що се раздаватъ въ бѣлиа-тѣ дробъ (*bronchite*).

Тая болѣсть, коя-то вжобщѣ е слѣдствиye на
 една простудка, се срѣща твжрдѣ често, и бива чес-
 то епидемическа (вишь по доло). Гржклана-тѣ нач-
 нава подиръ гжрло-то и свжршва чрѣзъ разни тжн-
 ки клончета що се раздаватъ въ бѣлиа-тѣ дробъ.

— Въ най просто-то си сѫстояние, обикновенно то-
 ва распаление начнава отъ една хрѣма на носа-тѣ,
 запослѣдвана отъ една горѣщина много или малко
 силна въ гжрло-то, послѣ отъ едно гадаличкание
 надъ гржклана-тѣ съ кашлица.— Общи-тѣ призна-
 ци се сѫстоijтъ отъ една горѣщина на кожа-та, отъ
 болки по снага-та и по членове-тѣ, или болки въ