

тѣ тѣзи двѣ лѣкарства, подобаватъ най-паче на жени-тѣ. За дѣца-та подобава **акон.**, когато има трѣска съ огнь; — **хамом.**, когато кашлица-та е нощна и суха, и го буди като спи; когато дѣте-то е нервическо и съ характеръ схрдитъ; — **инек.**, когато лице-то е червено-синкаво, когато храчки-тѣ се сбиратъ на гърло-то като че ще го задушатъ, когато му се подига или бжлва.

Ако распаление-то прѣмине въ хроническо състояние, дай **силис.** №30 по една лжжица ката сутрѣна. — Ако тя не произведе желаема-та цѣль, то дай **алли-сат.** №12 по същия-тъ начинъ.

Сички-тѣ други горѣказани лѣкарства, спорѣдъ положение-то на болниа-тъ, ще се даджтъ прѣвъ 2, 3 или 4 часа по една лжжица.

Когато распаление-то владѣе въ раздадени-тѣ *клончета отъ гржклана-то въ бѣлиа-то дробъ (bronchite capillaire)*, положение-то на болниа-тъ става твжрдѣ трудно: дихание трудно и бжрзо, съ пищение на гърло-то, най-паче на дѣтца-та; кашлица-та произвежда една силна болка мѣжду гърди-тѣ; болниа-тъ не може да лѣгне, отъ страхъ да не би да се задуши и пр.

Тѣзи опасна болѣсть е положена на подновяване, за това болниа-тъ трѣба да се пази добрѣ отъ да се не простуди. Тя се продължа отъ 5 до 15 дена.

Лѣчение.— Въ начало дай **акон.** №12 (6 гр. въ 30 др. вода) по една лжжица ката три ча-