

зр. въ 30 др. вода) по една лъжица ката сутрѣна.—Ако **карб.-вж.** не подобри никакъ болниатъ, то дай **арс. №30** по сжщиятъ начинъ. Ако послѣднѣо-то това лѣкарство докара подобрѣние, то го повтори, подиръ 7 дни, подъ **№100**.

Твхрдѣ рѣдко е, казва Лакузонъ, щото това лѣчение да не побѣди кашлица-та.

Сжществува йоще едно болнакаво свойство на гръклана-тъ, което се нахожда най-много въ старитѣ хора и въ тѣзи що сж кървави и пълни, въ тѣзи що иматъ тѣлесложение лимфатическо и прѣкарватъ сѣдящъ животъ. — То има за знакъ една суха, трудна и спазмодическа кашлица, съ затруднение и задушение на дихание-то — зачервяване на лице-то.— Подиръ тая криза или подиръ това трудно положение, болниатъ начинава малко по-малко да исхвърга едно голѣмо количество бѣли и лигави храчки, що мѣзатъ на бѣлтината на яйце-то, размѣсени съ воздухъ. Най-важно-то въ тая кашлица сж много-то храчки що изчерпватъ болниатъ и го исушаватъ. Тя се продължава твхрдѣ много време.

Лѣчение.— Изъ начало дай **арс. №30** (6 зр. въ 40 др. вода) сѣка сутрѣна по една лъжица. Ако има подобрѣние, продължавай; ако ли не, дай **калк.** и **карб.-вж. №30** (6 зр. въ 30 др. вода) въ размѣна по една лъжица сутрѣна и вечеръ (единъ день отъ едно-то, другъ отъ друго-то). Ако тѣзи двѣ лѣкарства докаратъ подобрѣние, пов-