

— Ако болки-тъ на глава-та, на уши-тъ и на челюсти-тъ сж твърдѣ силни съ щръкание на зъби-тъ и подутие на вратни-тъ сливици, съ хръма що поприця, тръпки студени или горѣщи и силенъ потъ, дай **мерк.-с.** №12 (7 зр. въ 30 др. вода) за дѣтца-та и жени-тъ, а **мерк.-в.** за мъжъ-то по една лъжица (за дѣтца малка) прѣзъ четири часа.— Ако болниа-тъ се плаче отъ една голѣма слабостъ и отъ неврически болки съ тръпки студени и горѣщи, дай **аре.** №30.— Ако съ кашлица-та се нахожда бълвочъ, носокръвотечение, дрисжкъ, дай **ишек.** по една лъжица прѣзъ 4-три часа.— Ако кашлица-та е непрѣстанна, безъ да дава покой на болниа-тъ, ни денѣмъ, ни нощѣмъ, съ умножение като си лѣгне; съ хръчки пѣнясти и бѣлизникави, съ болки по желудока-тъ; болниа-тъ бива навъсенъ, наскърбенъ или плаче, дай **пулс.** както **ишек.**— Ако признаци-тъ на желудока-тъ прѣодоляватъ надъ други-тъ, като: подигание, бълвочъ, неохотие, уста клѣвена безъ вкусъ, и дихание вонещо; запоръ или желтикавъ дрисжкъ; безсъние или сънь неспокоенъ; характеръ раздраженъ, дай **шукс.-в.** №12 по три лъжици въ день.— Ако кашлица-та е сждружена отъ ревматически болки на гръдни-тъ мишици, на членове-тъ, или отъ кръвотечение на носа-тъ и на уста-та, дай **ари.** №12 по една малка лъжичка прѣзъ 4-три часа.— Ако би съ кашлица-та се появи распаление на бѣлиа-тъ дробъ, то дай **акон.** и **брион.** въ размѣна (единъ пхтъ отъ едно-то,