

другъ отъ друго-то) по една малка лажичка прѣзъ 4-ри часа.

Хиршелъ казва че лѣкарства-та що подобаватъ най добръ изобщо на тая болѣсть и на нейно-то влияние врѣзъ нервическа-та система, сж: **кауст.** (най-паче въ начало ако се нахожда хрѣма, кашлица и главоболие), по сетнѣ **арс.** и **русь.**

Распаление на бѣлна-тъ дробъ (*Pneumonie*).

Това распаление начинава сѣкоги отъ една силна студенина, коя-то е заподирена отъ единъ притеснителенъ бодежъ на гърди-тѣ, кой-то се умножава отъ кашлица-та и затруднява дихание-то. Всяко дихание малко по силно, разбужда болки-тѣ и кашлица-та. Кожа-та на тѣло-то е сѣкоги суха и горѣща. Лице-то на болниа-тъ бива забруждено, най-паче страни-тѣ му снаватъ червено-сини. Храчки-тѣ незабавно ставатъ кървави; пулса-тъ, кой-то отъ начало е пжленъ, става твхрдъ и брѣзъ. Болниа-тъ лѣжи на гърба-тъ си, а не на страна-та си; той лѣуби да е спокоенъ, не обича да говори, и е злѣ расположенъ нарастенно; по нѣкоги бива схвѣтъмъ хладнокрхвенъ на то що се случва около него. Единъ знакъ кой-то не се забѣлѣжава въ никоя друга болѣсть на гърдитѣ, е че сѣкоги една отъ дебелитѣ сини жили на врата-тъ (изобщо лѣва-та) става по набѣбнхта и по голѣма отъ тѣзи що е на друга-та