

страна. Щомъ храчки-тъ начињтъ да се кхртијтъ, дихание-то става по охално, и кожа-та малко влажна, болниа-тъ е въ безопастность вѣки,

**Лъчение.** — Понеже обширност-та на распалени-то не може да се узнае и опрѣдѣли, освѣнь чрѣзъ тупканье-то и слушаніе-то на гхрди-тъ, кое-то непрѣменно изисква медицинско знаеніе, то ако не се намѣри медикъ, или се той убави да дойде, дай **акон.** №6 или 12 (6 зр. въ 30 др. вода) по една лжжица прѣзъ часъ или два, ако болниа-тъ е беспокоенъ. Но ако той желае да бѫде спокоенъ, и се страхува отъ сѣко движение, кое-то го газлѣва, то време-то на **акон.** е прѣминжало. Въ такжвъ случаѣ дай **бринп.** и **фосф.** (№12 или 30) въ размѣна по една лжжица прѣзъ 2 или 3 часа; по нарѣдко щомъ се появи подобрѣніе. Ако тѣзи двѣ лъкарства не бѫдатъ достаточни, то дай **сулф.** по 2 или 3 лжжици въ денъ—Ако би болниа-тъ да клони да бѫде чахоточенъ, то е по добрѣ **ланц.** или **фосф.** отъ **сулф.** — **Мерк.**, подобава ако болниа-тъ се поти не-прѣстанно и изобилно безъ да досеща иѣкое улекчение. — **Финумъ**, когато болниа-тъ е захласнѧть, като че спи джлбоко. Въ такжвъ случаѣ дай лъкарство-то подъ едно долньо нумеро прѣзъ  $\frac{1}{4}$  или  $\frac{1}{2}$  часъ, додѣ-то болниа-тъ излѣзе ото това положение. — **Тарт.-ем.**, когато болниа-тъ не може вѣки да храче храчки-тъ що се скбиратъ въ гхрдо-то му, и е подъ опасность да не би да се задави въ силно-то си хжрканіе. Въ такжвъ случаѣ