

дай това лѣкарство, отъ №3, сѣки $\frac{1}{4}$ часа една лъжица. Ако това лѣкарство не подѣйствиува, може да се даде **карб.-вж.** (№30) сѣки 5 или 10 минути.

Кржвоземаніе-то, що аялонати-тѣ непрѣстанно употребляватъ за тая болѣсть, е едно срѣдство твжрдѣ опасно; понеже пжрво-то кржвоземаніе като докара едно колко годѣ улеченіе, то се повтаря и потрета; тжй щото колко-то болниа-тѣ губи отъ кржвъ-та си, толкова той отпада, и распаденіе-то се обсилва и докарва едно гнойно теченіе на бѣлиа-тѣ дробѣ. Кржвоземаніе-то е опасно най-паче кога-то пулса-тѣ е обикновенно мѣкъ, слабъ и бржзъ, и когато бодежъ въ гжрди-тѣ не смѣстествува; при сичко това болниа-тѣ досеща една мжчнотна, една тѣгостъ вржзъ бѣлиа-тѣ дробѣ, и като си земе изъ джлбоко диханіе-то, една болка. Диханіе-то бива твжрдѣ често, и кашлица та, коя-то е довольно силна, ваді почти веѣкоги кржжави храчки. — Едно друго свойство отъ това расположеііе, на кое-то кржвоземаніе-то е смжртоносно, е когато то е медленно и лжжливо: въ начало болниа-тѣ прѣдставлява нѣкои леки признаци, подиръ кои-то внезапно притѣсненіе-то на гжрди-тѣ става затруднително и диханіе-то твжрдѣ кратко, тжй щото смжрть-та се случва въ малко едно време по слѣдствие на едно кржвостеченіе въ бѣлиа-тѣ дробѣ. — Лѣкарства-та що подобаватъ въ подобни случаи смж: вератр., арс., инек., ари., белл..

Распаденіе на бѣлиа-тѣ дробѣ по дѣтца-та.

Рѣдко е щото тая болѣсть да ожде пжрвоначална мѣжду дѣтца-та; тя дохожда почти сѣкоги