

подиръ едно распаление на *гръжлана-та*, на *йорганса-та* или на една *тифическа трѣска*. Йоще твждѣ е трудно да се узнае тая болѣсть въ дѣтцата, освѣнь отъ единъ добъръ лѣкаръ; понеже болка-та на бодержа-тъ не е явна, и храчи-тъ не сжществувать. Единъ кой-то не е омитенъ въ медицина-та, не му оставя освѣнь силна-та трѣска, трудно-то и бжрзо дихание на дѣте-то, отъ кои-то да може да заклучи едно подобно мѣние.

Лѣчение.—Додкторъ Тестъ рекомандува слѣдуищи-тъ лѣкарства: Въ начало дай **ипек.** № 6 (7 зр. въ 30 др. вода) по една лжжичка прѣзь 3 часа.—Ако распаление-то се нахожда особно вржъз дѣсна-та страна, дай **Хелид.-м.** № 12 по една лжжичка прѣзь $\frac{1}{4}$ часа, въ продължение на 4 часа, послѣ прѣзь $\frac{1}{2}$ часъ, а послѣ прѣзь часъ.—Ако распаление-то сжществува и отъ двѣ-тъ страни, или ако е то придружено отъ распаление на ципа-та или риза-та, що се нахожда мѣжду това орждие и рѣбрата, съ водонабрание, трудно и бжрзо дихание, потъ изобилень, дрисжкъ съ голѣма немощъ, дай **фосо.** № 12 (6 зр. въ 30 др. вода) по една лжжичка прѣзь часъ или $\frac{1}{2}$ часъ, спорѣдъ положението. Това лѣкарство подобава най-наче на русей-тъ и кротки дѣтца. Въ случай на едно обикновено распаление, то може да се даде послѣ **ипек.** или **хелид.**—Ако распаление-то е достигнхло въ своя-тъ *послѣденъ периодъ*, дай **спонж.-т.** № 12 (6 зр. въ 20 др. вода) по една лжжичка прѣзь часъ.