

Распаление на подрѣбренна-та ципа. (*Pleurésie*).

Ципа-та или риза-та, що обвива отъ една страна бѣлиа-тъ дробъ, а отъ друга покрива рѣбра-та, съставлява единъ мѣхъ безъ уста. Распаление-то на тая ципа има почти едни и същи признаци както това на бѣлиа-тъ дробъ, съ тая само разлика че бодежъ-тъ съществува обикновенно въ рѣбра-та подъ ципа-та, и е по силенъ отъ този на бѣлиа-тъ дробъ; болния-тъ обикновенно нѣма храчки, освѣнъ нѣкои пліунки по нѣкоги размѣсени съ малко кръвъ; утромъ, когато кожа-та на тѣло-то става влажна, болния-тъ се чувствува по добръ.

Лѣчение.—Въ начало дай **акон.** № 3 или 6 (6 зр. въ 30 др. вода) прѣзъ 2 или 3 часа по една лъжица. Щомъ трѣска-та, жажда-та и кашлица-та намалѣхтъ отъ влияние-то на **акон.**, то, ако съществува йоще бодежъ, дай **орпид.** № 12 или 30 (4 зр. въ 20 др. вода) по една лъжица прѣзъ часъ. Обикновенно тѣзи двѣ лѣкарства сж достаточни. Но, ако при всичко това съществува йоще една тѣгостъ и бодежъ-тъ, отъ най-малко-то движение, се появява, дай **сулф.** № 30 (4 зр. въ 20 др. вода) по една лъжица ката сутрѣча.

Сжца-та болѣсть по дѣтца-та.—Първобитно и особно тя е нѣщо рѣдко въ дѣтца-та; тя съществува почти сѣкоги съ распаление-то на бѣлиа-