

лица; болниа-тъ не може да лѣгне освѣнъ на гърба-тъ си или врѣзъ страна-та що страда.

За лѣчение-то на тая болѣсть се изисква омиотически лѣкаръ. Временно може да се даде **спонж.** №30 (7 зр. въ 40 др. вода) по една лъжица сутрѣна и вечеръ.

Бодежъа-тъ, що се явява въ време на дихание-то, не е сѣкоги знакъ на тая болѣсть, Ако не е сѣдруженъ отъ кашлица и отъ трѣска. Въ противенъ случай той е бодежъ ревматически (*Pleurodynie*), кой-то въобще начинава отъ болки на врата-тъ и на плещи-тъ.

Въ подобенъ случай дай **акон.** №12 (6 зр. въ 30 др. вода) по три лъжици въ день.— Ако това лекарство не е достаточно, то дай **арп.** по сѣщия-тъ начина.

Кръвостечение къмъ бѣлна-тъ дробъ.

То се случва често въ начало-то на единъ асматически припадокъ, или бива слѣдствие на една сѣрдечна болѣсть. Признаци-тъ що прѣодоляватъ сѣ: тѣгостъ и стѣснение на гърди-тъ, като че се пжлни съ нѣщо, отбивание и тупкание на сѣрдцето, кратко и тѣсно дихание. То може да дойде внезапно и да докара единъ смъртоносенъ ударъ, както се случва въ кръвоприлитие-то на глава-та; понѣкоги то влѣче подирѣ си кръвохрацаниа доволно опасни.

Лѣчение.—Дай **акон.** №12 (6 зр. въ 30