

Кръвохращение.

Тая болѣсть е свързана съкоги съ едно колко годѣ силно кръвостечение на гърди-тѣ. То е единъ важенъ признакъ, въ това отношение, че се отнася често къмъ едно дълбоко растройство на дихателни-тѣ органи. Когато кръвохращение-то произхожда отъ бѣлиа-тѣ дробъ, то болниа-тѣ прѣчувствува че то иде изъ дълбоко; то е пѣнесто и топло, и има въобще сладжкъ вкусъ; йоще, прѣди кървава-та хрчка, единъ кървавъ вкусъ се явява въ уста-та на болниа-тѣ; или той досеща съвременно една горѣщина въ гърди-тѣ. Въ подобни случаи болниа-тѣ трѣба да отбѣгва съко нѣщо що може да даде затруднение на бѣлиа-тѣ дробъ, като: говоранье, пѣяние, вжскачанье, движение, и пр.. По нѣкоги то бива слѣдствие на едно праховито диханье, кое-то раздражнява бѣлиа-тѣ дробъ.

Лѣчение. Въ сѣки случай не е злѣ да се распита добрѣ, ако е възможно, за точна-та причина. Тжй, ако кръвохращение-то е слѣдствие на единъ ударъ, на едно наданье, или на едно присилванье, дай **арн.** по една лжжица сутрѣна и вечерь.— Ако то е слѣдствие на едно кръвостечение къмъ гърди-тѣ съ трѣска и безпокойствие на болниа-тѣ, и кржвъ червеноясна: **акон.** № 12 (6 зр. въ 30 др. вода) по една малка лжжичка прѣзъ 4-три часа. Ако той не е достаточенъ, дай **арс.** по