

движѣи, даже и като се обрѣща въ лѣгло-то си. Тѣсноѣа и горѣщина въ гърди-тѣ съ неволно движение на тѣло-то; голѣма жажда, голѣма слабостъ. Подобава на всѣка астма когато се нахождатъ много храчки въ грѣклана-тѣ или болниа-тѣ храчи и зобилно. Припадоци-тѣ дохождатъ особно вечеръ или нощѣмъ около полунощъ; тѣзи що начинаютъ вечеръ отиватъ до полунощъ, но не по нататѣжъ. Обикновенно болниа-тѣ нощѣмъ е по злѣ.

Суло. — Подобава когато астма-та е хроническа, когато припадоци-тѣ непрѣстанно идѣтъ, когато най добри-тѣ лѣкарства не сполучѣатъ, когато жевиничево-то расположение сѣществува, най паче чрѣзъ едно гнойно течение отъ уши-тѣ. Тѣзи сѣ най главни-тѣ условия врѣзъ кой-то може да се даде горньо-то лѣкарство, най-паче ако болниа-тѣ чувствува като че има прахъ въ гърло-то си, или отъ най малкиа-тѣ пушакъ се затруднѣва.

Освѣнъ горни-тѣ лѣкарства йоще може да бѣдѣтъ въ полза и слѣдуѣщи-тѣ лѣкове :

Аписъ. Чувство като че врата-тѣ е твѣрдѣ стѣгнѣтъ. Хлѣбци-тѣ стоѣтъ като убити, най-паче този отъ лѣва страна. Вѣздуха-тѣ въ стая-та е несносенъ по причина на топлина-та и на главоболне-то що болниа-тѣ досѣща. — **Белл.**, като че гърди-тѣ сѣ твѣрдѣ пѣлни съ тупкание на сѣрдце то, залѣзъ и бодежъ по гърди-тѣ; кашлица суха; при всѣчко умножение на болки-тѣ отъ движение-то, болниатъ неможе да стои спокоенъ. — **Ілоп.**, припадоци-тѣ дохождатъ изъ вѣднѣжъ съ притѣснение на гърди-тѣ, безпокойствие и охкание.