

## Распаление на язика-тъ.

Ако то е верховно, дай **акон.** въ размѣна съ **белл.** по три лжжици ката денъ отъ съко едно. — **Ари.** и **кон.** подобаватъ подиръ едно наравнаване. — **Ледумъ,** подиръ едно обождане. — **Апистъ** когато се нахождатъ малки прищики по краища-та на язика-тъ, или болниа-тъ чувствува като че е упаренъ, или болки съ щръкане. — **Аре.** въ размѣна съ **лани.**, въ най силни-тъ случаи, когато гангrena-та може да се появи. — **Епаръ** въ размѣна съ **белл.**, ако язика-тъ начне да бере. — Противъ парализиа-та на язика-тъ, подобава: **белл.**, **носк.**, **шуксъ-носх.**, кои-то дай наредъ както сѫ, съко едно 36 или 48 часа, въ силни-тъ случаи; въ хронически-тъ по двѣ лжжици на денъ въ продлжление на 8 дни. — Противъ тая болѣсть йоще подобаватъ: **кауст.**, **шуксъ-в.**, **руст.**, **они..**, **кок..** — Дѣтица-та що немогжть да говоријть, Гулонъ прѣдлага да се дава на дѣте-то ката 8 дни отъ 3 до 6 зр. **натр.-м.** №30. — Закоравяване-то на язика-тъ изисква **мерк.-сол.** въ размѣна съ **белл.** или **фос.-ас.,** ако то е слѣдствие на едно прѣхапване.

**Ридъ,** **гвѣтъ,** **мржспостъ,** и пр. на язика-тъ. Характеристически-тъ му указания спорѣдъ *Poë.* Когато язика-тъ е сжвѣстъ червенъ съ малки издадени пижчи-