

ци, изисква се: **белл.**, **тарт.-ем.**; — когато той е лжскавъ-червенъ: **кали-бихр.**, **лаш.**; — вржхъ червенъ подъ образъ триагжленъ: **русь**; — вржхъ червенъ (злѣ опрѣдѣленъ) съ краища червени: **сулф.**; — языкъ съ уловенъ цвѣтъ: **аре.**; — языкъ синкавъ: **дижит.**, **аре.**, **мур.-ас.**; — языкъ бѣло-мржсенъ отъ двѣ-тѣ страни: **каует.**; въ срѣда-та само: **фосф.**, **брион.**; — твжрдѣ мржсенъ само въ джно-то: **сени.**; мржсенъ подъ видъ на пятни околчести: **аре.**, **лаш.**, **натр.-м.**, **питр.-ас.**; — языкъ сухъ, червенъ съ напуканъ вржхъ: **лаш.**, **русь**, **сулф.**; — сухъ безъ жажда: **брион.**, **пуле.**, — мѣкъ съ знакъ на зжби-тѣ **мерк.**, **русь**, **страм.**; — языкъ чистъ съ желудочно страданне: **ипек.**, **сени.**, **дижит.**; — трѣперание на языка-тъ що болниа-тъ не може да го покаже: **лаш.**; — языкъ тѣжжкъ, трѣперливъ, съ челіустъ провиснжта; или болниа-тъ си држпа языка-тъ на бжрзо и неволно, и го прѣхвжрля вржзъ една-та и вржзъ друга-та страна: **ликоп.** (тифич.-трѣска).

Гжрлоболне.

Гжрлоболне-то се ограничава въ распаление-то на *небе-то*, на *мжжеца-тѣ*, на *сливици-тѣ* и на *гория-та частъ на гжрло-то*. — Общи-тѣ признаци сж: изъ общо тржнки, неблагоприятность, отжалѣвание, суша въ гжрло-то и трудно прѣглжщанне. По сетнѣ гжрло-то се подува и става червено — подутие, кое-то доволно скоро порастя, мжжеца-тъ както и сливици-тѣ се захващатъ, отъ гдѣ-то произхожда и трудно-то прѣглжщанне; болката даже може да се простре чакъ до срѣдно-то у-