

(6 зр. въ 30 др. вода) по една лъжица сутрѣна и вечерь. — Четри дни подиръ свършване-то на туй лѣкарство, дай **брион.** по сжщиятъ начинъ. — Послѣ едно четиридневно растояние, дай **суло.** въ размѣна съ **пукс.-в.** По една лъжица ката день отъ сѣко едно вечерь три часа подиръ яденіе-то.

Ако чрѣзъ това лѣчение не изчезнѣтъ сички-тъ болки, то подиръ едно растояние отъ 15 дни, повтори го пакъ подъ №30 вмѣсто 12.

Ако по слѣдствие на распадение-то се появѣтъ *рани* въ желудокъ-тъ, или ако се нахожда *ракъ*, кое-то се узнава отъ бѣлвочъа-тъ, въ когото ако се нахожда *гной* или *крѣвъ*, то е знакъ на проста рана; ако ли нѣкъ той е *черенъ* и *мѣза на кафяна вода*, то е ракъ. Въ такъвъ случай дай изъ начало **арс.** №12 (7 зр. въ 40 др. вода) по една лъжица сутрѣна и вечерь. — Четри дни подиръ това лѣкарство, дай **ликон.** по сжщия-тъ начинъ. — Четри дни подиръ **ликон.**, дай пакъ **арс.**, и заподирвай по тозъ въ размѣна начинъ до поправленіе.

Желудочни первически болки

(*gastralgie*).

Тѣзи болѣсть е хроническа и не редовна, и се сжстои отъ болки надъ лъжичка-та; тя когато не зависи отъ едно органическо растройство на