

желудока-тъ, се отличава по това че болки-тъ ѝ сж пориодически, то е дохождатъ отъ време на време. Тя бива обикновенно сжединена съ друга една болѣсть, често съ немощъ-та (*anémie*) подиръ една загуба отъ кръвъ, подиръ една отслабителна болѣсть; тя се нахожда въ хлоротически-тъ жени и въ тѣзи що сж чахотчеви. Тя бива йоще слѣдствие на една болѣсть въ корема-тъ, на еморроиди-тъ, на ревматизма-тъ, на една болѣсть въ матка-та, на мѣсячени твхрдѣ изобилни или скорошни, отъ раздразнение-то на грѣбнашка-та жила, и пр. Въ сички-тъ тѣзи случаи, лѣкаръ-тъ трѣба да внимава особно да побѣди основателна-та болѣсть, отъ която зависи всичко; послѣ обикновенно ще изчезнатъ болки-тъ на желудка-тъ.

Лѣчение. На хора чернооки, гнѣвливи и наклонни на запоръ, подобава **пуксъ-в.** въ размѣна се **брион.**— Ако тѣзи двѣ лѣкарства не сж достаточни за да излѣчатъ сжвършено болка-та, то дай **карб.-вж.**— На нервически-тъ и деликатни жени, подобава **хамом.**— Ако тя не е достаточна, послѣ дай: **белл.**— На хора отъ тѣблосложение живиничево или заразени отъ рани и кожни болѣсти: **калк.-к.** въ размѣна съ **сулф.**— Ако болниа-тъ се жалва отъ една голѣма слабостъ въ емилание-то на ястие-то съ подутие на желудка-тъ и болѣзничева тѣгостъ подиръ едно най малко ядение или пиание: **пиана.**— Ако при неохотие-то, болниа-тъ е блѣденъ съ подутие на желудка-