

кое-то се случва най-много на тѣзи що страдатъ отъ истеризмъ и ипохондриа.

Трудно-то мление на желудока-тъ, изисква спорѣдъ причини-тѣ що сж го произвели, лѣкарства-та кои-то указахме за нервически-тѣ болки на желудока-тъ. Ако причина-та не може да се открие, то отбери едно отъ по доло изложени-тѣ лѣкарства като земешъ подъ внимание и тѣзи на нервически-тѣ болки.

**Лѣчение.**— Най необходимо-то нѣщо е болниа-тъ да си измѣни лошави-тѣ прѣвички; то е да яде горѣ доло въ редовни часове, да сдѣлква добрѣ ястиета-та, да пуши по малко или, ако е възможно, сжвсѣмъ да не пуши. Спиртовни-тѣ както и брашнени-тѣ нѣща, трѣба да се избѣгватъ. За ипохондриаци-тѣ както и за тѣзи що водятъ единъ сѣдѣщъ животъ, необходимими се упражнениа-та на откритѣ въздухъ.

За обикновенни-тѣ страдания вжобще рекомандуватъ слѣдујущи-тѣ лѣкарства: **нуксъ-в.** и **граф.** или **сулф.**: дай една взятка *нуксъ* единъ часъ прѣди ядение, а *граф.* или *сулф.*, единъ часъ послѣ ядение. *Сулф.* или *граф.*, може да се замѣни съ **лаш.**, когато болки-тѣ на желудока-тъ сж твърдѣ чувствителни, тжй щото болниа-тъ не може да тѣрпи никакъ облекло-то що го стѣга; съ *шип.*, когато кислота-та на желудока-тъ прѣодолява.

**Антим.-кр.** Хроническо неохотие съ отвращение кжмъ сѣко ястие, или желание на кисели