

стига само да се дава подъ долнѣо нумеро и често. Спорѣдъ Херингъ изпомѣжду може да се дава по малко кафе.

4) Коликъ первически. Главно-то лѣкарство е **колок.**; но може йоще да се дадхтъ: **игна.**, когато колика-тъ е слѣдствие на една скжрбъ или на едно оплашвание;— **он.**, подиръ едно внезапно щрѣкание;— **велл.**, когато болки-тъ се нахождатъ на пжна-тъ, като че се щипатъ червата. Отъ едно вжнкашно налѣганіе болка-та намалява;— **плумб.**, когато припадѣци-тъ се случватъ съ свиваніе на пжна-тъ; въ подобенъ случай се рекомандува йоще **купр.** и **арс.**

5) Коликъ отъ сѣществуваніе-то на глисти въ черва-та: мерк.

6) Коликъ оловенъ (коликъ сухъ): он.

7) Коликъ мѣденъ: енаръ, нукс.-в. или белл.

Сичкитѣ отъ другъ видъ колики, като що произхождатъ отъ еморроиди, отъ камжкъ въ злжката, отъ едно кржвостечение, отъ едно распадение на черва-та и проч., не сж освѣнь признаци на една болѣсть и изчезватъ като се изличи главната болѣсть.

Распадение на черва-та (*entérite*)

Въ начало болниа-тъ досеща нѣкои леки или силни болки по корема-тъ, болки кои-то вжобщѣ