

начнаватъ отъ около пѣпа-тъ за да се разнесхтъ по други-тъ части на корема-тъ. Дрисжка-тъ що сжществува въ подобенъ случай, се прѣдизвѣства отъ обсилване-то на болки-тъ. Ако дрисжка-тъ се случва често, то сѣдалище-то начина да гори и да боли; и спорѣдъ негово-то умножение и това на болки-тъ, сили-тъ на болниа-тъ начинаватъ да отпадатъ; охотие никакво съ умножение на жаждата. Ако болка-та се обсили йоще, то се появява трѣска, коя-то въ начало вжобще не сжществува, съ главоболие, прималяване, подигание и бжлвочъ. Распаление-то може да обладае схвременно и желудока-тъ.

Лѣчение. Въ начало дай **акон.** № 12 (6 зр. въ 30 др. вода) по една лжжица или лжжичка (спорѣдъ вжзржеть-та) ката 4-три часа. При свжршване-то на това лѣкарство, ако би распаление-то се обсили, то дай **калк.-к.** № 12 по една лжжичка ($\frac{1}{2}$ за дѣтца-та) ката три или 4-три часа. Ако подобрѣние-то що произведе това лѣкарство не се продлжи, то измѣни и дай **фосф.-ас.** по сжщиа-тъ начинъ.—Щомъ сила-та на дрисжка-тъ намалѣе и се измѣни въ простъ дрисжкъ, дай **хамом.**—Ако при силни-тъ болки и при *силно-то прѣсвивание въ черва-та, корема-тъ е подутъ и твжрдъ болѣзнавъ отъ единъ най-малжкъ натискъ съ напжль за да ходи по вжнз безъ никакво слѣдствие*, или мрасотии черникави, зеленикави, червеникави или кжрвави, то дай **мерк.-кор.**