

№ 12 (6 зр. въ 30 др. вода) по една лъжица (за дѣтца-та $\frac{1}{2}$ малка лъжичка отъ 3 часа на 3) отъ 4-три часа на 4-три.

Ако би распаление-то стане хроническо, то дай **ликоп.** **№ 30** (6 зр. въ 30 др. вода) по една лъжица сутрѣна.— Една недѣля подиръ свършване-то на това лѣкарство, дай: **сулоф.** по сжщиятъ начинъ.— Послѣ една недѣля повтори пакъ **ликоп.** — и тѣй по нататѣкъ слѣдвай, като разрѣдявашъ повѣче растояние-то колко-то подобрене-то се указва.

Сжществува едно распаление въ дѣтца-та що завладѣва тѣнко-то и дебело черво (*entéro-colite*) и е тѣхрдѣ опасно. То се познава по признацитѣ дѣто дѣте-то е беспокоино, дѣто сжнѣа-тъ му е лекъ съ често будение; то си свива крака-та кжмъ корема-тъ като пици и се движи; неохотно или отвратително хваща цица-та; или ако суче съ охота, то почти въ сжщо-то време го бжлва; дрисжкъ желтикавъ. — Въ нѣколко дни дѣте-то исххва, кожа-та му се набржкква, очи-тѣ му потжватъ, тѣй щото замѣзва на единъ прѣстарѣлъ человекъ въ лице-то. Дихание-то му бива кисело и языка-тъ му съ червени капки. Въ едно по силно положение, крака-та му и ржце-тѣ истиватъ, дрисжка-тъ отъ желтъ, се измѣнява въ зеленъ и воденъ; пикочъ-та е рѣдка и пулса-тъ се вжскача до 120 въ минута-та. Ако би дрисжка-тъ отъ зелено-воденъ се измѣни въ желтъ и почне да става по гжстъ, пи-