

и мърдание докарва отчаяни болки. Болния-тъ като е затѣгнхтъ отъ доло, поврща отъ горѣ; дишание-то му отъ болки става трудно; корема-тъ му бива повѣче подутъ и обтѣгнхтъ; болния-тъ бива безспокоенъ и пулса-тъ му е брхвъ и пхленъ; въ зло полужение той стига отъ 115 до 125, става немощенъ, слабъ и проч.

Лѣчение. Главно-то лѣкарство въ начало е **акон.** (8 зр. въ 40 др. вода) по една лжжичка отъ два часа на два, или по добръ **акон.** въ размѣна съ **брион.** по сжщна-тъ начинъ отъ 2 часа на 2, единъ пхтъ отъ едно-то, другъ отъ другото. — Ако би да се появи лудость и бжлувание, то дай **акон.** или **брион.** въ размѣна съ **белл.** по сжщна-тъ начинъ. — Ако жажда-та е твхрдѣ голѣма съ напхнъ отъ доло и кхрвави мрасотии, потъ изобиленъ, пикочъ мхтна и вонѣща, лице желтикаво и развалено, непрѣстанно жалвание съ умножение на сички-тѣ болки нощѣмъ; въ такхвъ случай дай: **мерк. в.** № 12 (7 зр. въ 30 др. вода) по една лжжичка прѣвъ 2 часа. — Въ случай на адинамически немощни признаци, дай **русъ** по сжщна-тъ начинъ.

Диета-та е необходима; болния-тъ може да зема само хладна и подсладена вода.

Дрисжкъ.

Дрисжка-тъ не е болѣстъ, той често е признакъ на една болѣстъ, или слѣдствие на едно прѣядание,