

гато поникнхтъ кучешки-тѣ зхби, то е кжмъ 12
13 мѣсець.

Какви-то и да бждхтъ причини-тѣ на дрисжка-
тъ, трѣба да се зематъ гигиенически-тѣ нуждни
мѣрки, кои-то сж: разходка по чистѣ въздухъ, чист-
тота въ тѣло-то, ястие добро и прч.

Главно-то лѣкарство за дѣтца-та е **хамом.**,
най паче за тѣзи що сж живиничеви, що зхби-тѣ
имъ никнхтъ трудно, и що иматъ безпокоителни
болки по корема-тъ; — **iiiiii.**, когато мление-то е
трудно, или когато ядение-то излиза не смлѣто и
дѣте-то лхмти за вода като му прѣсххва уста-та;
— **арс.**, когато ястие-то излиза не смлѣто безъ
жажда и прѣсххвание на уста-та; — **инек.**, подиръ
една простудка; — **реумъ**, когато дрисжка-тъ има
киселъ дххъ.

Сички-тѣ лѣкарства що се отнасятъ до дрисж-
ка-тъ ще се даватъ подъ № 12 и по една лжи-
ца ката 2, 3 или 4 часа, или по-добрѣ подиръ
сѣко излизание (за дѣтца-та по една малка лжичка).

Сухъ дрисжкъ

(сѣ напжнъ и кржвъ—*dysenterie*)

Тая болѣсть често бива епидемическа, и се
сжстои отъ распадение-то на дебело-то черво и
това на сѣдалеще-то. Тя е сждружена отъ единъ
дрисжкъ на когото мрасотии-тѣ сж почти нищо;
тѣ се сжстохтъ вжобще отъ единъ кжрвавъ слузъ,