

еморроиди-тѣ се казватъ *текущи*; но ако би това течение да е рѣдко или никакъ да не съществува, тѣ се наричатъ *сухи*. — Признаци-тѣ що ги узначаватъ сж: мѣки мами отъ разна голѣмина съществујущи или въ вѣтрѣшность-та на черво-то или вжнка по край-тѣ; вжобще болки-тѣ имъ биватъ бодливи изъ джлбоко съ шрѣкание и сжрбелъ, най-паче когато иде болниа-тѣ за себе си: често тѣ биватъ придружени отъ единъ запоръ много или малко упоритъ.

Причина-та на тая болка е повѣче-то една много хранителна и раздражителна храна, а най-паче за тѣзи що воджтъ единъ сѣдящъ животъ.

Лѣчение. Най главни-тѣ лѣкове сж: **сулф.** № 30 и **пукс.-в.** № 12 въ размѣна (6 зр. въ 40 др. вода) по една лжжица сутрѣна и вечеръ (единъ день отъ едно-то, другъ отъ друго-то). Три дни, подиръ свжршвание-то на горни-тѣ, дай йоще по 3 зр., въ размѣна, прѣзъ три или 5 дни отъ сжщи-тѣ лѣкове. — Ако би случайа-тѣ да е твжрдѣ лекъ, може йоще изъ начало лѣкове-тѣ да се даджтъ по 3 зр. прѣзъ 3 дни или 5 дни.

Въ случай че черво-то излиза като болниа-тѣ иде по себе си, съ силни болки и горѣние на сѣдалище-то, съ коликъ по корема-тѣ, голѣма слабость, упоритъ запоръ, течение кжрваво или слувесто, то дай **лаш.** № 12 или 30 (6 зр. въ 40 др. вода) по една лжжица сутрѣна и вечеръ. — Ако би да се сжглежда опасность че ще се появи