

гангрена, то дай **арс. №12** въ размѣна съ **карб.-вж. №12** (7 зр. въ 40 др. вода) по една малка лъжичка прѣзъ 4-три часа. — Ако би, отъ едно изобилно течение, болниа-тъ да е отслабналъ много, дай **шина №6** по 3 лъжици въ день.

Излизание на черво-то.

Ако би то да се случва отъ време на време и да е черникаво и кърваво, дай **мерк.-в. или сол. №12** (6 зр. въ 30 др. вода) по една лъжица или лъжичка сутрѣна и вечеръ. — Ако би то да се случва въ сѣки пхтъ като отиде по вжнъ за себе си болниа-тъ, дай **сулф. №30** въ размѣна съ **калк.-к. №30** (6 зр. въ 30 др. вода) по една лъжица или лъжичка ката сутрѣна.

Глисти.

Най вѣрни-тѣ признаци за сжществувание-то на глисти въ дѣтца-та сж тѣхно-то изхвжряние; но понеже по пѣкоги тѣ може да се сплитатъ дѣ-то да не е вжзможно ни една да се изхвжрли, то ето обикновенни-тѣ признаци що може да се забѣлѣжжтъ по дѣтца-та:

Болки много или малко, прѣидание и подутие на корема-тъ съ дрисжкъ; языкъ мржсенъ и постоянно желание да пліе; подигания или бжлвочъ, съ нередовна охота кога много, кога никаква и джхъ кисель; лице блѣдо и оловено; **раздразнение**