

и *сърбѣлъ* въ носа-тъ, що каратъ дѣте-то често да го човърка и чеше; чувство подъ лъжичка-та като че нѣщо го гризи.

Лѣчение. Въ леки-тъ и скорошни случаи, дай **шина № 6** (7 зр. въ 30 др. вода) по една лъжица сутрѣна и вечерь. Единъ день или два дни послѣ свършване-то на горньо-то лѣкарство, дай **мерк.-с. № 6** (7 зр. въ 30 др. вода) по сжщиа-тъ начинъ.— Три или четри дни полиръ свършване-то тоже на туй лѣкарство, дай нѣколко пхтя въ размѣна, прѣзъ 4-три дни, по 3 зр. единъ пхтъ **мерк.**, другъ пхтъ **суло.**— Ако би охота-та да е прѣкалена дѣто болниа-тъ да нѣма насита, или ако би сливици-тъ да се подутѣ, то вмѣсто **суло.**, дай **калк.-к.**— Ако би болно-го да има делиръ, припадоци, спазми, епилепсиа или силна кашлица, дай **стан. № 30** (7 зр. въ 40 др. вода) по една лъжичка прѣзъ $\frac{1}{2}$ часъ въ най голѣма-та сила на припадока-тъ. Щомъ прѣмине припадока-тъ, по една лъжица сутрѣна и вечерь.

Единъ видъ малки глисти, що сж като малки черавчета тѣнки като конецъ, и що иматъ сѣдалище-то си въ краѣа-тъ на гхзно-то черво, произвеждатъ единъ силенъ сърбѣлъ на сѣдалище-то въ дѣтца-та и една нередовность изобщо въ пицеварителни-тъ сждлини.

Лѣчение.— Лѣчение-то кое-то сполучва повѣче, е лѣчение-то що рекомандува Тестъ, кое-то изобщо прѣпоржчатъ и другитѣ: