

Въ начало дай **Ферр.** до една или двѣ недѣли по една лъжица сутрѣна и вечерь; той подобава даже и когато крака-та се подутѣ. Но ако пикочь-та е млѣчна, то **Фосф.-ас.**, по сжщия-тъ начинъ, подобава по добръ.

Неволно пикание или не задържане на пикочьта.

Ако този недостатокъ се случва денѣмъ, дай **кауст.** № 30 (6 зр. въ 40 др. вода) по една срѣдня лъжица сутрѣна и вечерь.— Ако това лѣкарство не сполучи, както се изисква, то дай, по сжщия-тъ начинъ, **пулс.** въ размѣна съ **русъ**, единъ день отъ едно-то, другъ отъ друго-то.— Въ подобенъ случай йоще сж полезни: **арн.** и **Фосф.**; въ случай твждѣ упоритъ: **аре.**, **зинк.**; ако то зависи отъ едно страдание на гръбнашка-та жила: **нуке.-в.**, **русъ**; ако то зависи отъ едно органическо растройство: **петрол.**

Нощно-то напикавание изисква нѣкои гигиенически срѣдства. Трѣба дѣтето да си лѣга на твждѣ постелки — и то подиръ два часа отъ ядението, като се испикае; да не употрѣблява солени нѣща, ни пжкъ раздражителни питиета, нито да пие много вода вечерь. Денѣмъ йоще трѣба да задържа пикочьта си довольно дълго време, щото да прѣвикни.— Послѣ дай **бел.**, най-паче на дѣтца-та що сж руси и съ голѣма глава, по една лъжица или лъжичка, спорѣдъ дѣте-то, сутрѣна и вечерь.— Ако **белл.** не е достаточна, дай послѣ **пулс.** въ раз-