

ствие на едно подутие, на единъ полипъ, на едно тѣлесно расположение, или на една тѣжка болѣсть.

Лѣчение. Като общо срѣдство, додѣто дойде лѣкаръ-тъ, дай **секалъ к.** №3 (7 зр. въ 6 лжжици вода) по една лжжица прѣзъ $\frac{1}{2}$, единъ, два, три или четири часа, спорѣдъ силата на болѣсть-та. — Сжщо-то това лѣкарство може да се даде въ размѣна съ **инек.** №3 когато кръвъ-та е *червена-алена*.

Когато причина-та на кръвотечение-то е позната, по добрѣ ще бжде щото *секалъ* да се даде въ размѣна съ едно отъ слѣдующи-тъ лѣкарства :

Съ **ари.** №3 (7 зр. въ 6 лжжици вода), ако то е слѣдствие на едно уморяване ;

Съ **брион.** №3 (7 зр. въ 6 лжж. вода), ако то е слѣдствие на единъ гнѣвъ или на една сжрдития ; или на конецъ :

Съ **они.** №3 (7 зр. въ 6 лжж. вода) ако то е слѣдствие на едно внезапно стрѣскание.

Въ случай че нѣма лѣкаръ, то отбери отъ слѣдующи-тъ лѣкарства това що е найъ много подобно :

Акон. Подобава когато, щомъ стане болна-тъ, дохожда ѣ залѣзъ дѣто е прѣнудена да си лѣгне. Страхъ на сѣки часъ че ще умрѣ.

Ари. Ако кръвотечение-то е слѣдствие на единъ ударъ, на едно уморяване.

Белл. Ако болна-та чувствува като че плодородни-тъ ѣ орудна ще се истржсжтъ или испжжнѣ, съ болки по корема-тъ и по бжбрици-тъ (като строжени); лице