

ма-та, особна чувствителность на майка-та, или лиу-тина-та на пліунка-та отъ страна на дѣте-то.

**Лѣчение.** Като прѣдохранителна мѣрка, три, чѣтри недѣли йоще прѣди раждане-то, испромивай зржна-та съ студена вода два или три пхтя въ 24 часа. При сичко туй, ако би, подиръ раждане-то, болка-та да се появи, то щомъ дѣте-то пусне-цица-та, испромий зржно-то съ слѣдујуща-та вода:

**Ари.** тентуръ меръ. . . . . 1 малка лжж.

Вода студена. . . . . 10—12 лжж.

Йоще испромивай зржно-то, прѣди да го да-дешъ на дѣте-то, съ млѣко и хладна вода.

До дестина дена, прѣвъ два или три деня да-вай йоще на болна-та по 3 зр. отъ **ари.** № 3. Нѣколко дни, подиръ свхршване-то на това лѣ-карство, дай, два или три пхтя, по 3 зр. **сулф.** № 30 прѣвъ 3 или 10 дни растояние.

Спорѣдъ тѣлосложение-то на болка-та йоще може да бждѣтъ полезни **хамом.** или **калк.-к.**

Въ случай че *дѣте-то не раче* да суче по причина че млѣко-то не е добро, дай на майка-та **мерк.** и по-послѣ **сина.** Ако млѣко-то е желтикаво и горчиво: **реумъ;** — ако е синкаво: **ланг.;** — ако е много мазно: **пулс.;** — ако се прѣсича често: **бор., ланг.**

Когато *млѣко-то тече отъ само себя си изъ ци-ца-та*, дай **калк.-к.** или **белл.;** **брион.,** когато то те-че повѣче вечеръ, или **шина,** когато то докарва една голѣма слабостъ.

Когато млѣко-то не е достаточно, или е спрѣло дай: **пулс.;** или спорѣдъ обстоятелства-та: **белл., брион.**