

Болка на мамн-тѣ.

По нѣкогн мамн-тѣ ставатъ чувствителни и болѣзнави, по причина на едно случайно спирание на млѣко-то отъ да се суче, или по причина на едно негово намалявание.

Лѣчение. Въ лека-тѣ случаи, дай 3 зрѣнца **брион.** № 12, и ги повтори подиръ два дни; послѣ, подиръ четри дни, дай 3 зр. **сулф.** № 30. Когато болка-та е слѣдствие на една простудка, прѣди да употребишь горѣ-казани-тѣ лѣкове дай:

Акон. № 3 7 зр.

Вода 6 лжж.

по двѣ или три лжици въ день.

Когато на мамн-тѣ се появѣтъ болки, въ време като се отбие дѣте-то, то дай **пулс.** № 12 (7 зр. въ 6 лжж. вода) по четири лжици въ 24 часа.

Въ случай че мамн-тѣ се напргнѣтъ по причина че дѣто-то не рачи да суче, то измучи млѣко-то чрѣзъ една толумбичка. Ако би да нѣма толумбичка, то земи една чаша въ коя-то постави малко памукъ намокренъ отъ ракиенъ спиртъ, когато като запалишь, прѣлѣуни чаша-та врѣзъ мамата. Вѣздуха-тѣ, като истини, се сгѣстява, и по слѣдствие на това чаша-та се впила въ мамата, и начинава да тегли млѣко-то. — Ако подутие-то е слѣдствие на единъ ударъ, на едно душевно сму-