

щение, или на една простудка, то употреби лѣкове-тѣ на тѣзи случаи.

Распадение на мамитѣ.

Въ време на доение-то, ако би мамитѣ да се подуятъ и распалиятъ, то дай **брион.** № 12 (6 вр. въ 6 лжжици вода) по една лжжица прѣзъ 4-три часа. Подиръ това лѣкарство дай **белл.** по сжщия-тъ начинъ. Изъ общо тѣзи двѣ лѣкарства намаляватъ болки-тѣ и подутие-то; само може да останятъ нѣкои ятки подути, за които дай **мерк.-с.** № 30.

Въ случаи че при употребление-то на горнитѣ лѣкове, мама-та начне да бере, кое-то се узнава отъ нейно-то щрѣкание, то дай въ размѣна **енаръ** и **мерк.** № 30 или **енаръ** и **сил.** № 30 прѣзъ два или три часа. Съ употребление-то на тѣзи лѣкове, подутие-то ще озрѣе, ще се пробие и ще заздрави скоро.

Ако би болна-та да е расположена често да ѝ се подуватъ и пробиватъ мамитѣ въ слѣдствие на кое-то се набиратъ много зарасли мѣста, кои-то пречятъ на млѣчно-то течение, то, въ подобенъ случай, спорѣдъ Гернсея, подобава най добръ **граф.**, № 30 кой-то дѣйствувалъ да не се образовать въ-ки нови подутиа.