

ДОХОДНО ПТИЦЕВЪДСТВО

Органъ на Българския Птицевъденъ Съюзъ — София
Vereinsblatt des Bundes Bulgarischer Geflügelzüchter
E. V. — Sofia.

Годишенъ абонаментъ 50 лева предплатени.

За д-ва, кооперации, учреждения, читалища, ученици, трудоваци, войници и членове на птицевъднитѣ дружества и клубове 40 лева.

Обявления и реклами се приематъ по споразумение.

Всичко, което се отнася до списанието, да се изпраща до редакцията — Плѣвень.

Редакторъ М. Ц. Цоневъ.

СЪДЪРЖАНИЕ:

1) Къмъ абонатитѣ. 2) За курника — Д-ръ С. Игнатовъ. 3) Образци курници — W. Aretz. 4) Какъ да увеличимъ носливостта у кокошките? — П. Д. Кършевъ. 5) Болести — Д-ръ С. Игнатовъ. 6) Презъ юний въ птицевъдния дворъ — М. Ц. Цоневъ. 7) Причинитѣ за снисане на ненормални яйца — П. А. Петровъ. 8) Нови пжтища въ птицевъдството и яйчарство — Херманъ Дитрихъ. 9) За носливостта на птицитѣ въ Централната Опитна Станция — София. 10) Съюзенъ и кооперативенъ животъ.

Къмъ абонатитѣ!

Голѣми сж трудноститѣ, които редакцията трѣбва да преодолява. Нашето списание изнемогва финансово, то е младо и не се ползва отъ благоволенieto на ничия държавна и обществена подкрепа. Но за това бърже се разраства и подкрепя отъ тѣзи които, го високо ценятъ и за които то излиза .

За да бжде обаче, редакцията улеснена при издаването му, желателно е всички неиздължили се още абонати да сторятъ това въ най-скоро време.

Следния бори 7 ще излезе предъ септемврий.

Отъ редакциония комитетъ.

Д-ръ С. Игнатовъ.

За курника.

Домашнитѣ птици, отъ които днесъ чакаме по-голъма носливостъ, ще ни дадатъ повече яйца, ако ги поставимъ въ добри условия на животъ, ако най-първо имъ построимъ подходящъ, отговорящъ на всички изисквания на науката, техниката и стопанската практика курникъ. Нашия народъ казва, че къща (жилище) се строи за зимата, курникъ ще кажемъ ние се строи за зимата и лошитѣ вѣтровити и дъждовни дни презъ годината. Въ курника кокошкитѣ на модеренъ и не модеренъ птицевъдецъ прекарватъ презъ това време почти цѣлия день — повече отъ 14 — 18 часа.

Ето защо, голѣмо внимание трѣбва да обърне птицевъда на курника, защото чрезъ отговорящия курникъ се запазва здравето на птицитѣ, а само здрава кокошка е нослива, произходяща и отъ най-носливата раса или фамилия.

Основнитѣ условия, на които трѣбва да отговаря единъ курникъ сж: да има въ него, колкото се може повече, въздухъ, но безъ течение; да влизатъ въ него колкото се може повече слънчеви лъчи и свѣтлина; да е сухъ, чистъ и съ умерена температура.

При тѣзи условия трѣбва да бждатъ гледани нашитѣ носливи кокошки, съ тѣхъ тѣ трѣбва да сж евакуали, за тѣхъ тѣ трѣбва да иматъ нуждната тѣлесна издръжливостъ, които условия ще имъ позволятъ тѣ да развиятъ най-голъма носливостъ.

Лесно е да се каже на какви условия трѣбва да отговаря единъ курникъ, мжно е да бждатъ съчетани онѣзи купъ обстоятелства, които да гарантиратъ тѣзи условия.

Американцитѣ иматъ най-отговорящъ типъ курникъ съ известни размѣри, германцитѣ другъ, ние — българитѣ нѣмаме такъвъ, нито за цѣлата страна, нито за отдѣлни области съ рѣзко различаващи се климатически условия.

Рѣдката по своята суровостъ минала зима показва колко неподходящи за нашитѣ условия сж курницитѣ — модернитѣ курници съ зименъ дворъ. Констатирахъ, че у много модерни птицевъди птицитѣ бѣха съ измръзнали гребени и менгуши, а нѣкъде и пръсти. Повече отъ стопанитѣ ми заявяваха, че кокошкитѣ измръзнали не въ спалнята, а въ зимния дворъ. Това иде да ни покаже, че и въ областъта на стопанскитѣ сгради преписването, или превеждането отъ хора, чиято компетентностъ се изчерпва съ владението на единъ чуждъ езикъ е опасно и вредно за стопанското преуспѣване на птицевъдеца у насъ,

Въ по-голѣмата частъ отъ нашитѣ земледѣлски стопанства кокошкитѣ спятъ и земе и лѣте, или по дървѣтата, или въ помѣщения, които могатъ да служатъ за всичко друго, но не и за курникъ. По принципъ курника не може да бжде изграденъ заедно съ обора, или конюшната; Не бива това да се допуска като „изключение“, или само „временно.“

Въ следующитѣ статии ние ще се спремъ върху разнитѣ видове курници и грѣшкитѣ, които станаха и ставатъ отъ страна на държавнитѣ земледѣлски катедри, които не позволяваха на никой модеренъ стопанинъ птицевъдецъ да измѣни въ нѣщо плана на приетия типъ курникъ, само който се признава за модеренъ и чиито стопанинъ само може да разчита на държавна субсидия чрезъ Подвижната земледѣлска катедра.

Най-важния въпросъ, първия въпросъ, който ни се изпречва е въпроса: *къде е най-доброто мѣсто за курникъ?*

Такова мѣсто е *само добре запазеното отъ ветроветъ и сухото*. Построения на това мѣсто курникъ трѣбва да бжде съ лице на югъ, или югоистокъ. Само при това положение имаме сутришно слънце, рѣдко пѣти дъждъ да бие въ прозарцитѣ и никѣга нѣма да имаме вѣтъръ да бие право въ курника, въ прозорцитѣ.

Трѣбва да кажемъ, че всѣки стопанинъ, който е свързанъ съ своя дворъ, или земя, трѣбва самъ да опредѣлимѣстото, най-подходящото мѣсто за курникъ, като държи разбира се смѣтка за господствущитѣ презъ годината вѣтрове и други климатически фактори.

Не може да искаме, щото единъ стопанинъ съ стопанство въ нѣкое равно поле да си построи курникъ на юженъ склонъ, какъвто нѣма въ стопанството, или да искаме, щото мѣстото да бжде хълмисто. Трѣбва да се знае само, *че курникъ не дива да се построява на нѣкой връхъ, или въ нѣкоя влажна низина.*

А имаме ли на разположение само влажно мѣсто, или мочурливо такова, то можемъ да си помогнемъ да опитаме да го подобримъ, чрезъ дренажи, или чрезъ изкопаване на канали (окопи) за оттичане на водата. Ако подпочвената вода е много плитко, тогава ще трѣбва да не строимъ курника на земята както се казва съ 20 см. цокль, защото въ случая и най-добрата бетонна плоча не помага. Въ такъвъ случай курника трѣбва да се построи на пилоти (на колове) или стълбове, които да сж най-малко 1 м. високи т. е. да има 1 метъръ между земята и пода на курника, за да може лесно да се чисти подъ него, да може да се разкопава.

Само добъръ курникъ не е достатъчно. Нуженъ е и дворъ, ако искаме кокошкитѣ ни да останатъ здрави и да развиятъ най-голѣма носливостъ. Двора трѣбва да бжде широкъ, слънчевъ, запазенъ отъ вѣтроветъ съ добра паша т. е.

свързанъ съ ливада, овощна градина, или мѣсто съ шубраци, кждето птицитѣ да могатъ да дирятъ храната си цѣль день, при добро врѣме.

Ако нѣма естествено препятствие за вѣтроветѣ (гора, шубраци, хълмове, или постройки) такива трѣбва да се създадатъ за двора и пашата чрезъ искусствени стени отъ дъски, дървета, или да се засадятъ акации, лешници и пр. шубраци отъ къмъ северната, источната и западнитѣ страни, отъ кждето духатъ силнитѣ и студени вѣтрове и забива дъжда и снѣгътъ. Тѣзи искусствени стени (живи плетове) осигуряватъ сѣнка за птицитѣ и имъ позволяватъ лесно да се запазятъ отъ нѣкои неприятели, главно отъ грабливи птици.

Ако не разполага стопанството съ широко пасище, ливада, овощна градина, гора и пр. то малкото мѣсто за паша трѣбва да се раздѣли съ огради, презъ които да не могатъ да прехвъркватъ птицитѣ, на 3—4 отдѣлни парцели, кждето птицитѣ ще се пущатъ по редъ. Като опасатъ едната парцела, да се пуснатъ въ втората, следъ това въ третата, четвъртата и пакъ въ първата и т. н.

За вѣтровито и лоше време, или презъ зимата, когато птицитѣ не могатъ да излѣзатъ на вѣнъ, трѣбва да има сушина добре запазена отъ вѣтъра, дъжда или снѣга, кждето птицитѣ да могатъ да се поразходятъ и поровятъ. Това е необходимо за онѣзи стопански дворови, кждето нѣма фуражни навеси, кошове и пр. които кокошкнтѣ сами добре изпозватъ въ такива дни.

Най-добрия материалъ за курникъ е всѣкога най-ефтиния. Новия курникъ трѣбва да се построи и изгради съ такъвъ материалъ и съ разчетъ че ще трае 30 години. Колко би струвалъ единъ курникъ, изграденъ отъ по-лошъ материалъ, отъ сбиротакъ такъвъ, ако ежегодно трѣбва да се харчатъ пари и време за поправки?

На въпроса да се построи курникъ т. е. неговитѣ външни стени отъ камъкъ, или тухли, или дърво, може да се отговори много лесно, като се знае каква предпазна стойностъ иматъ отдѣлнитѣ строителни материали, срещу студа и топлината.

Тухлитѣ	иматъ	1'40	предпазна	стойностъ.
Дъскитѣ	„	3'30	„	„
Гипсови пл.	„	2'50	„	„
Цигли	„	1'00	„	„

Каква предпазна стойностъ иматъ стенитѣ отъ плетъ съ каквито се градятъ и жилища за хората у насъ, даже и двуетажни. Плетъ измазанъ съ калъ и слама и следъ това бѣлосанъ съ варъ, стени които срѣщаме у насъ съ столѣтно съществуване, не знаемъ, но вѣрваме, че нашитѣ птицевѣдни станции, заедно съ компитентни инженери и архитекти ще ни дадатъ въ *най-скоро време единъ положителенъ отговоръ.*

Така сжщо чакаме тѣхния отговоръ и за таванъ построенъ отъ дървета, увити съ слама добре нацапани съ калъ — глина; за двойни северни стени на курника и пр.

Сжщо така важенъ хигиениченъ въпросъ е дали цигления покривъ е по-подходящъ за нашитѣ селско стопански условия и климатъ, или такъвъ отъ ржжена слама на снопчета. каквито сж покривитѣ на кжщитѣ на банатченитѣ.

Пода най-цѣлесъобразно за лесно измазване и почистване е да е бетонъ но не успоримо е, че такъвъ подъ е най-студенъ и ще трѣбва всѣкога да има постояненъ постелъ отъ слама 20—30 см. дебелъ, за да предпазва птицитѣ отъ студа и влагата.

Относително материяла, отъ който трѣбва да бжде изграденъ курника у насъ, ние сме съ разбирането, че трѣбва да се използватъ главно ония материяли, съ които се разполага въ дадена мѣстность или стопанство, *като се цѣли да се построи хигиениченъ, топълъ курникъ*. На това обстоятелство главно обръщаме внимание на нашитѣ птицевѣди, то трѣбва да бжде ржководно начало и на ония институти, които направляватъ строежа на селско стопанскитѣ сгради, като се въоржжатъ съ данни, що намира практиката, която трѣбва добре да изучатъ.

W. Aretz

архитектъ

Образци курници.

Тукъ дадения образецъ за курникъ е за 100 кокошки, и то главно за мѣста безъ силни вѣтрове и студове. Въ студени области съ силни вѣтрове и дебели снѣгове за предпочитане е, покрива да е така наречения *покривъ седло*, който издържа натиска на вѣтроветѣ и снѣга.

Форма на курника. Основнитѣ стени сж 6 на 6 метра т. е. 36 квадратни метра. Покрива е съ единъ наклонъ (на калканъ).

Преимущества на този видъ покривъ предъ другитѣ покриви сж:

1. Имаме едно по-добро огряване (освѣтяване) на курника.
2. Конструкцията е много лесна и може да се направи и отъ неспециалистъ майсторъ.

Недостатъцитѣ му сж:


1. Лошо провѣтриване на курника,
2. Слаба устойчивость на натиска отъ силнитѣ вѣтрове и дебелитѣ снѣгове.
3. Значително лесно изстудяване (или затопляне) въ сравнение съ седловия покривъ, подъ който се настиля слама.

При разграничението, разпредѣлението вътрешнитѣ отдѣления, отъ южната страна по цѣлия фронтъ е единъ *коридоръ* 1.60 м. широкъ, който позволява да има прицевъдеца лесенъ и бръзъ погледъ върху цѣлата вътрешност на курника и лесно да преглежда и нарежда сждоветѣ за храна и водопойкитѣ.

Пода (дюшето) тукъ е бетонъ 12 см. плоча и върху нея 2 см. гладкъкъ цементъ.

4. Скелета е построенъ отъ токове (греди) 8/8 и 6.8 см. Съ огледъ на трайността и издръжливостта на стенитѣ и курника не могатъ да се употребятъ по тънки греди.

Вмѣсто бичени греди могатъ да се употребятъ и обли дървета, които ще струватъ и по-ефтино. Обеленитѣ дървета се издълбаватъ само отъ дветѣхъ страни.



фиг. 1.

Общъ изгледъ на едноскатенъ курникъ за 100 кокошки.

5. Външната облицовка и покрива на курника се правятъ отъ долски (24 м. м.) дъски, които не се рендосватъ, но се изработватъ на жбъ и длбъ.

Ако препоръчамъ нерендосани дъски, защото рендосанитѣ отъ една страна стѣпятъ само малко по-скжпо, това правя не отъ съображения за икономия, а защото рендосанитѣ дъски намазани съ карболинеумъ изглеждатъ като истрити, а нерендосанитѣ, изработени на жбъ и длбъ сж еднакво дебели и широки и много добре се наивасватъ.


Въ случая не могатъ да се употребятъ по-тънки дъски.

6. Изолацията въ спалнята на кокошкитѣ надъ дъската за куришкитѣ, а сжщо и таваня става чрезъ една вътрешна облицовка съ летви добре замазани. Мѣстото между външната и вътрешната облицовка (кухата стена) се изпълва съ сгуръ, а гдето това е възможно и съ торфъ. Малкото мѣсто

задъ полозитѣ, или контролнитѣ гнѣзда подѣ дѣската за курешкитѣ, не трѣбва да са смѣта за изгубено, защото тукъ въздуха служи като изолационно срдѣство и предпазва спалнята.

Спалнята може още да има сгѣваеми капаци отпредъ, съ които да се затваря зимно време, или пердетата отъ зебло.

7. Върху дѣскитѣ на покрива могатъ да се сложатъ катранени мукави. Тукъ не може и дума да става за цигли, едно поради слабия наклонъ и поради това, че тѣ много лесно пропушчатъ топлината.




фиг. 2. Напрѣченъ разрѣзъ на курника. Б — Бетонна плоча 12—15 см. дебела. Т — Торфъ, стѣрготини или мазилка. Г — торфъ (слама) по-дебела. С — врата на вентилатора. Г — мазилки отъ варъ или калъ съ плѣва. К — покривна мушама — рубероидъ.

8. Прозорцитѣ трѣбва така да сж направенн, че презъ тѣхъ да минаватъ слнчевитѣ лжчи и свѣтлината и въ най-крайния жгълъ въ курника, безъ да има течение на въздуха.

Въ плана имаме триканатни прозорци отъ 1.15 см. на 1.60 см. Тѣ сж поставени 50 см. надъ бетония подѣ (дюше-

мето) и при постелъ отъ 25 — 30 см., тѣ сж. само 25 — 30 см. надъ него, така че долната греда нѣма да може да се поврежда отъ краката на птицитѣ, или отъ поставенитѣ до него сѣдове за храна, или вода.

Горната частъ на прозорцитѣ трѣбва да се отваря навътре. Навътре трѣбва да се отварятъ и дветѣ долни канати, а третѣ да могатъ и да се откачатъ. Предъ стѣклата на прозорцитѣ отъ вътре се поставя телена мрежа. Презъ лѣтото прозорцитѣ оставатъ денонощно отворени.



фиг. 3. Основенъ разрѣзъ, 1 : 10, пространство за разхождане на 1 птица 0'28 кв. м., сжщо за спане на птица 0'08 кв. м. Г — мазилка, К — желязни консули, С — врати, Л — свѣтлина.

При много лошо време, горнитѣ прозорци се затварятъ. Оставатъ отворени само вентилаторитѣ. За последнитѣ не се предвиждатъ капаци, защото не трѣбва да се изнежватъ много кокошкитѣ.

Препоръчва се да се отварятъ и западни, прозорци за да се използва следобѣдното слънце, но трѣбва да се оста-

вятъ и врата, а съ това се има опасностъ отъ течение.

Не се препоръчватъ прозорци съ рамки на сюрме т. е. да се разминаватъ.

9. Вентилиации. На южното лице се предвиждатъ 4 прозорчета съ мрежа 22 на 45 см. презъ които влиза чистия въздухъ. Презъ тѣхъ лѣтно време се прочиства въздуха и охлажда курника.

Въ срѣдата на курника е вентилаторната камина, която изсмуква разваления въздухъ. Тя разбира се може да се остави и въ страна.

За да може да се вкара студенъ въздухъ въ курника презъ лѣтото, предвиждатъ се прозорчета на северната старна на курника и то между излепенитѣ летви до тавана и покривнитѣ дъски.

10. Вътрешно разпредѣление. Полозитѣ сж предвидени въ два реда подъ дъската за курешкитѣ. Мѣстото за ровене е добре оградено и е около 28·80 квадратни метра, добре осветлявано, защото на него отговарятъ 5·50 кв. метра прозорци т. е. 20⁰/₁₀.

Коритата за хранене и водопойкитѣ трѣбва да бждатъ височко надъ земята сжщо и автомата за храната, ако има такъвъ.

Пжрветѣ, на които спятъ кокошкитѣ, сж сложени върху желѣзни люлки, за да нѣма кжде да се криятъ кокошинки и други паразити по кокошкитѣ.

Въ следната книжка ще дадемъ другъ образецъ.

П. Д. Кършевъ

(Стоп. Караорманъ с. 1 Миндя—Еленско)


Какъ да увеличимъ носливостъта у кокошкитѣ?

Споредъ опититѣ на Raerl е доказано, че фактора на женския полъ никогашъ не се съединява въ една полова клѣтка съ фактора на носливостъта. Съ други думи казано: *женския полъ и носливостъ сж несъвмѣстими*, а на практика излиза, че носачката опредѣля полтъ, а носливостъта се предава отъ пѣтельтъ и обратното отъ кокошката на мжжкитѣ приплоди, ако тя е нослива т. е. съ факторъ на носливостъ. Отъ изледванията по този въпросъ е доказано, че

1. Кокошкитѣ сж *полово хетероциготни* т. е. че иматъ

въ дадена полова клѣтка както фактора на мъжкия, така и на женския полъ. Рис. А, фиг. 1 а.

2. Пѣтлитѣ сж *полово хомоциготни* т. е. въ една полова клѣтка иматъ само факторитѣ на мъжкия полъ Рис. А. фиг. 2.



Колкото за носливостъта като факторъ, опититѣ на сж-щия ученъ сж доказали, че кокошкитѣ по отношение носливостъта биватъ две категории:

1^о *Хетероциготно носливи* т. е. въ половата клѣтка има факторъ на носливостъ (добри носачки) Рис. Б. фиг. 4 и

2^о *Хомоциготно неносливи* т. е. въ половата клѣтка нѣма факторъ на носливостъ (лоша носачка). Рис. Б. фиг. 5. Въ случая носливостъта не е абсолютно понятие, понеже почти нѣма случай на дѣвствена кокошка. За първата категория носачки се смѣта срѣдна носливостъ 200 яйца годишно, което при отклонение може да падне подъ 100 и да достигне 300 и повече яйца, а за втората категория, въ никакъвъ случай да не догони 150 яйца най-много, смѣтани винаги за първия периодъ на яйценосенето.

Пѣтлитѣ по отношение фактора на носливостъта биватъ при категории:

1^о *Хомоциготно носливи* (напълно годенъ пѣтелъ за разплодъ) Рис. Б. фиг. 1.

2°. *Хетероциготно носливъ* (полугоденъ за разплодъ)

Рис. Б, фиг. 2.

3. *Хомоциготно неносливъ* (напълно негоденъ за разплодъ) Рис, Б, фиг. 3. Въ случая носливъ пѣтль се разбира; че е съ факторъ на носливостъ, а не че носи яйца.

Отъ всичко това следва, че вътрѣшно (физиологически) както носачките, така и пѣтлитѣ се рѣзко отличаватъ по отношение носливостта, макаръ вънкашно да сж еднакви по опититѣ (изравненъ цвѣтъ на перушината), по тѣлосложение (еднакви гребени) и т. н. Отъ тукъ и заключението, че не всѣкога бѣдия цвѣтъ на перушината въ легхорна или черния въ минорката сж гаранция за носливостта имъ. Въ практиката рѣдкото отличие на носливостта се търси и намира само




Рис. В.

Обяснение:

К—кокошка

П—петель

Ж—женска

М—мъжко

Голѣмитѣ кръгове сж полови клѣтки съ факторитѣ на женски и мъжки полъ. Надъ тѣхъ стоящитѣ малки кръгове сж кокошка и петель. Запълненитѣ кръгове и сектори е фактора на носливостъ.

чрезъ контролата и нейната регистрация. Ето значението на контролното гнѣздо, чрезъ което положително се издирятъ както добритѣ носачки (по голѣмина снесенитѣ и пр. яйца) така и добритѣ (хомоциотнитѣ пѣтли). Разбира се, че пѣтлитѣ не носятъ и не влизатъ въ контролнитѣ гнѣзда, но отъ тѣхнитѣ дъщери (приплоднитѣ имъ) ще узнаемъ какви сж тѣ. Напримѣръ, хомоциготния (годния) пѣтль ще даде носачки (дъщери) теоретично всичкитѣ — 100%, добри, хетероциготния — 50%, а хомоциготно неносливия нито една добра носачка. Но фактически това не излиза на практика, защото

при най-благоприятния случай, а той е добра носачка, покрита съ добъръ пѣтеть не даватъ приплоди съ абсолютно — 100% носливостъ, а най-много до 75% носливи.

Че това е така се вижда ясно отъ построенитѣ диаграми — (Рис. В.) на комбинацитѣ отъ 2 категории носачки $\times$ 3 категории пѣтли = 6 типични случаи за обща носливостъ въ дадено кокоше стадо.

1-та комбинация е хетероциготно (а носливо добра) кокошка покрита отъ *хомоциготно носливъ пѣтеть* (годенъ). Резултата е = 75% носливостъ въ стадото. Останалитѣ 25% сж носачки съ носливостъ подъ срѣдната норма т. е. лоши носачки за случая, които се откриватъ само чрезъ контролното гнѣздо. Пѣтлитѣ отъ тази комбинация сж положително годни за разплодъ. Яйца за разплодъ се взематъ само отъ носачкитѣ, достигнали най-високия пунктъ на годишна носливостъ за случая.

2-та комбинация е хетероциготно нослива (добра) кокошка, покрита отъ *хетерациготно носливъ* (полугоденъ) пѣтеть. Резултата е = 50% висока носливостъ въ кокошето стадо. Пѣтеть за разплодъ *може* да се вземе само *чрезъ подборъ*, защото при тази комбинация на равно се получаватъ *годни и полугодни* пѣтли. Яйцата за разплодъ отъ такова стадо не е желателно да се взематъ.

3-та комбинация е хетероциготно нослива кокошка (добра), покрита отъ *хомоциготно неносливъ пѣтеть*. Резултата е = 25% отъ носачкитѣ съ висока носливостъ. Пѣтеть и яйце за разплодъ не се взематъ отъ такова стадо.

4-та комбинация е една отъ най-интереснитѣ. Тя е отъ *хомоциготно ненослива* (лоша) носачка, покрита отъ хомоциготно носливъ (добъръ) пѣтеть. Въ резултатъ отъ тази комбинация се получава бързо отъ неносливо кокоше стадо, каквито сж повечето въ страната отъ мѣстната неподбрана кокошка носливо поколѣние, шомъ се покриятъ кокошкитѣ отъ расовъ хомоцигатно носливъ пѣтеть или *мѣстенъ такъвъ* (доказанъ). Приплоднитѣ на пѣтлитѣ (добритѣ) покрили лошитѣ кокошки даватъ 50% яйца съ висока носливостъ за първата година, за да се разпадне носливостъта презъ втората година и падне до 25%, понеже отъ тази комбинация синоветѣ на хомоциготно носливитѣ пѣтли ставатъ хетероциготни т. е. полугодни (вижъ комбинаци до 2^и) носливостъта веднага намалява. Това явление мнозина птицевъди сж наблюдавали въ кокошето си стадо, шомъ смѣнятъ негоднитѣ пѣтли и вкарать въ сжщото расовъ годенъ пѣтеть (получаване хибриди, мелези). Само съ тази комбинация може да се оправдае масовото производство въ птицевъднитѣ станции на хомоциготно носливи пѣтлета и тѣхното раздаване на населението съ цѣль на бързо повдигане носливостъта на мѣстната, сравнителна ненослива кокошка, но подъ условие че такива

пѣтли ще се запазватъ или редовно подновяватъ, а приплодитѣ имъ (пѣтлетата) се отстраняватъ отъ стадото.

5 и 6-та комбинации, като неблагоприятни за птицевъда не представляватъ интересъ, защото отъ негодно съ полугодно или негодно съ негодно нѣма никаква стопанска полза. Въ тѣзи случаи слабата носливостъ минава въ противоналожността (антипода на носливостъта) *бързо уговяване и затлъстяване* при условие, че птицата е здрава.

Заклучението отъ дотукъ казаното е, че да увеличимъ бързо носливостъта на кокошето си стадо трѣбва да имаме на лице доказанъ хомациготно носливъ пѣтель, а такъвъ ще има птицевъда, когато чрезъ контролнитѣ гнѣзда самъ издире най цѣната си хетероциготна носачка, отъ която ще си отвѣди пѣтле, което ще бжде годно, ако баща му е хомоциготни носливъ. Понеже гаранция за такъвъ баща — разплодникъ, не всѣкога има, ако такъвъ се достави, то оставя чрезъ *наблюдение и подборъ* птицевъда самъ да мине последователно отъ четвъртата комбинация къмъ втората и най сетне се спре на първата. По този начинъ, макаръ бавенъ, но сигуренъ, ще се добере чрезъ контролното гнѣздо и подборътъ до *хомоциготно носливия пѣтель*, алфата на доходното птицевъдене за яйца, но подъ условие, че ще храни усилено съ питателна, диетична и най разнообразна храна младитѣ пилци въ напълно здравословенъ птичарникъ. Отъ близкото кръвнородство нѣма опасностъ, стига разплодницитѣ да сж здрави, въ смисълъ, свободни отъ наследствени болести и тѣлесни недостатъци.

Д-ръ С. Игнатовъ.

Болести.

Нѣма да правимъ описание на заразителнитѣ болести по кокошкитѣ. Намираме за нашъ дългъ, да припомнимъ на птицевъдцитѣ, че месецитѣ юлий, августъ и септемврий сж, презъ които заразителнитѣ болести по кокошкитѣ най често избухватъ и опустошаватъ птицитѣ въ единъ курникъ, или дворъ, или въ цѣлото село, че и села.

Дългъ е преди всичко на отдѣлния птицевъдецъ, въ случай че му умре една или нѣколко птици, да се погрижи, за да запази другитѣ си птици, като ги зарови дълбоко въ земята, или изгори труповѣтѣ. Който остава трупъ на кокошка на боклука, или на торището въ двора си, той остава — болестъта да унищожи всичкитѣ му кокошки.

Да унищожи кокошкитѣ на съседа, че и на цѣлото село. Ето какъ немарливостъта на единъ стопанинъ може да

нанесе на всѣко домакинство загуби отъ по петдесетъ кокошки, които струватъ 2500 до 3000 лева, като не смѣтаме загубата отъ яйца.

Какво значи загуба на петдесетъ кокошки за нашето дребно земеделско стопанство, това най-добре знаятъ самитѣ стопани.

Втора длъжностъ на стопанина е, въ случай, че зачестатъ смъртнитѣ случаи, или има масово заболяване на пилци, да съобщи на кмета, който трѣбва веднага да уведоми ветеринарната властъ, за да се взематъ ония мѣрки отъ последната, които закона за Санитарно-Ветеринарната служба предвижда за ограничители и прекратяване на болестта.

И най прочутия докторъ не може да стори много нѣщо ако той се научи за върлуването на болестъ по кокошкитѣ, когато тя е обхванала цѣлото село, когато труповетѣ на умрѣлитѣ птици сж хвърлени и лежатъ по смѣтищата, или изъ окопитѣ.

Най-важния човѣкъ за борба съ болеститѣ по птицитѣ си остава стопанина, следъ него иде общинското управление, което чрезъ своитѣ органи да не допусне да остане незаровенъ, или неизгоренъ нито единъ трупъ и най послѣ ветеринарната властъ, която може да бжде полезна да запази голѣма частъ отъ птицитѣ на селото, ако бжде своевременно уведомена отъ общинския кметъ.

Голѣмъ грѣхъ върши всѣка общинска властъ, ако спойно гледа на този бичъ по кокошкитѣ, който унищожава сладки надежди на бедното селско семейство, а съ това става и причина за загубването на значителенъ националенъ капиталъ и трудъ.

Презъ месецъ юлий и августъ въ много страни се практикува ваксенирането — болясането на кокошкитѣ, главно едногодишнитѣ пилета, противъ болестта, дифтеритъ по кокошкитѣ, което ги предпазва отъ заболяването отъ казаната болестъ за една година.

Нашия Ветеринарно-Бактериологически институтъ, въ София произвежда такава ваксина, която се отпуска само на ветеринарни лѣкари.

Стопани птицевъдци, особено такива, които иматъ изолирано, т. е. отдалечено отъ други, или селото, стопанство, могатъ да се възползватъ отъ това срѣдство на нашия Институтъ и да поискатъ услугата на ветеринарнитѣ лѣкари, за да запазятъ отъ дифтерита кокошкитѣ си, която болестъ, както знаемъ, взема голѣмъ процентъ жертви между кокошкитѣ — особено Италиянкитѣ и нѣкои други отъ внесениѣ отъ скоро у насъ расови кокошки.

Имаме и други срѣдства за борба съ дифтерита по кокошкитѣ, но за тѣхъ ще говоримъ другъ пжтъ, следъ като видимъ резултата на действието имъ при повечко случаи.

М. Ц. Цоневъ.

Презъ юний въ птицевъдния дворъ.

Най-важната работа на птицевъда презъ този месецъ е основното почистване на курника отъ паразити. Много е полесно да се предотврати появата на разнитъ видове паразити, отъ колкото да се боримъ съ тѣхъ, за това прочистването и дезинфекцирането се предприема о време.

За да предотвратимъ тѣхното разпространение и нападане на птицитъ, поставятъ се така нареченитъ *пепелни* бани. Тѣ се състоятъ отъ обикновенъ пепелъ, въ който се смесва малко негасена варъ на прахъ, сѣра въ които птицитъ съ особено охата се кжпятъ.

Трѣбва обаче въ началото още на месеца да се прегледатъ както старитъ птици, така сжщо и растящитъ пилета най-щателно, за да се установи да ли тѣ сж нападнати отъ паразити, които често пжти биватъ въ такова количество и не само че спиратъ носливостъта, но причиняватъ смъртъ.

Въ този месецъ носливостъта започва да намалява. Трѣбва да се знае, че птици които започватъ рано презъ юний да си смѣнятъ перата, не сж добри носачки и тѣхното понататашно подържане е тежастъ на стопанството.

Не по-малко внимание трѣбва да се отдава при храненето на птицитъ които, спрели да носятъ, могатъ лесно да затлъстѣятъ, и това сжщо така трѣбва да се избегва, защото такива екземпляри, макаръ и прекарвали линеенето, не пронасятъ.

На късноизлупенитъ пилета се дава мека храна забъркана съ прѣсно млѣко. Тѣхната храна трѣбва да се засили достатъчно съ рибено и месно брашно, за да могатъ тѣ въ началото на ноемврий да пронесатъ. При добре отгледанитъ леки раси, както е легхорна, възможно е, излупенитъ въ начало презъ юний пилета, да пронесятъ въ есенъта безъ никакви особени грижи.... Понеже времето е много горещо, меката храна не бива да се оставя повече отъ 20 минути на разположение на пилетата, защото се кисва. Сждоветъ за вода да се прочистватъ редовно и често.

Слънчевитъ лжчи презъ този месецъ грѣятъ най-силно, затова повече отъ необходима е сѣнката както за старитъ птици така и за младитъ. Израсналата и застарѣла трева трѣбва да се окоси, защото тя не е така сочна и причинява запекъ у птицитъ. На много мѣста пущатъ овцитъ въ птичия дворъ, за да не израства и застарява зелената и сочна хранителна трева.

Презъ юний птицитъ страдатъ отъ тения, глисти, окуцватъ и спиратъ носенето. За да се избегнатъ тия неразполо-

жения съ тѣхъ, достатъчно е да прибавимъ 2%, тютюневъ прахъ къмъ дневната имъ храна.

Да се контролиратъ най-сериозно разклопалитѣ се кокошки (мжтачки), които заематъ постоянно положитѣ на другитѣ кокошки. За това всѣка вечеръ трѣбва да прегледаме всички гнѣзда, въ които носятъ кокошкитѣ, и залежалитѣ се да изхвърляме и отвикваме.

Особено важна е грижата да снабдимъ презъ тия горещи дни птицитѣ съ студена и прѣсна вода, единствения източникъ отъ кждето тѣ черпятъ прохлада презъ непоносимитѣ горещини.

Яйценосенето презъ юни е 16—18 яйца на птица.

П. А. Петровъ.

Ст. агрономъ

Причинитѣ за снисане на ненормални яйца.

За снисането на ненормални яйца отъ нашитѣ домашни птици чуваме най-различни обяснения, които въ известни случаи даватъ поводъ на слабопросвѣтения птицевѣдь да си вади най-чудни и странни по сжщество заключения.

Презъ моето стажуване, имахъ възможность да се сблъскамъ по отъ близо съ тия интересни обяснения и схващания на народнитѣ маси за снасянето на ненормални яйла. Така напр. за снасянето на малки безъ жълтъкъ яйца сжществува следното вѣрване у народа; че въ семейство притежаващо такава кокошка, ще се случи нѣкое нещастие. За да се провѣри, дали действително ще се случи нещастие, завързватъ кокошката въ една торбичка и я прехвърлятъ презъ покрива на кщцата, което се повтаря до три пжти, въ случай, че кокошката остане жива, това означава, че въ семейството не ще се случи нищо и пр.

Друго вѣрване е, че въ семейства, кждето има кокошки снасящи яйца съ двоенъ жълтъкъ, ще настѣпятъ шастливи дни, такива кокошки ги пазятъ добре, тъй като тѣ сж носителки на *благополичieto*.

И за това, цельта на настоящата ми статия, е да дамъ едно научно обяснение за снасянето на ненормални яйца, съгласно теоретическитѣ и практическитѣ обяснения и изследвания на добре подготвенитѣ птицевѣди.

Подъ думата *ненормални яйца* разбираме такива, които иматъ следнитѣ характерни белези: яйца съ два жълтъка,

безъ желтъкъ, безъ черупка, съ кърваво петно на желтъка съ червеи въ белтъка и двойно яйце.

За да стане ясно на читателитѣ образуването на горепоменатитѣ яйца, необходимо е да се даде едно обяснение за всички фази, които претърпява яйцето до неговото окончателно формиране и запознаването съ анатомията на половия органъ на кокошката. Последния се състои отъ *яйчникъ*, където се образуватъ желтъцитѣ, следъ него следва яйчното отверстие, където пада желтъка следъ озрѣването му. Това падане привежда желтъкътъ въ движение около себе си и въ това състояние слиза надолу въ белтъчното отдѣление, където белтъка се напластява въ концентрични кръгове около желтъкътъ. Следъ натрупването на необходимото количество белтъкъ, яйцето, продължавайки да се движи около себе си, слиза по-надолу и достига до отдѣлението, където се образуватъ дветѣ подчерупчени ципи. По-нататкъ яйцето продължава своятъ път и достига черупната стаичка, където става образуването на черупката. Най-после въ известни раси настѣпва обагрянето на черупката, което се образува отъ жлези намиращи се въ основата на черупната стаичка; по тоя начинъ се извършва цѣлата еволюция по формирането на яйцето.

Това обяснение по образуването на нормалното яйце е необходимо; за да стане ясно начинътъ, по който се образуватъ ненормалнитѣ яйца.

Има редица причини, на които се дължи снисането на ненормални яйца, главната причина е даването на неуравновесена храна, липса на варовити вещества въ храната, излишекъ на азотни вещества, излишекъ на мазнини, липса на вода, присѣствие на паразити; всички тия горепоменати причини пречатъ на снисането на нормални яйца.

Яйце съ два жълтъка. Вследствие голѣмата производителна енергия на яйчникътъ, отдѣлятъ се едновременно два жълтъка, които падатъ въ белтъчното отдѣление, тукъ двата жълтъка биватъ обгърнати отъ излжчващиятъ се белтъкъ, по нататкъ продължава образуването на яйцето по същиятъ начинъ, както бѣ при нормалното яйце. Яйца съ два жълтъка се търсятъ на пазарътъ благодарение на своята голѣмина.

Яйце безъ черупка. Тѣй като жлезитѣ, отлжчващи варовитото вещество, сж неактивни, което е резултатъ на угоеността на кокошкитѣ или извънредно голѣмата носливостъ и липса на варовити вещества въ храната, могатъ да станатъ причина, щото кокошката да снесе яйца съ много тънка черупка или съвършено безъ такава, покрити само съ дветѣ подчерупчени ципи.

Едничко е обяснението за снисане на яйца безъ черупка отъ кокошки, които иматъ голѣма носливостъ: вследствие голѣмото отлжчване на жълтъци отъ яйчникътъ, черупчнитѣ

жлезе не могат да смогнатъ и отлжчатъ достътъчно количество варовити вещества и по тоя начинъ отъ време на време кокошката сниса яйца безъ черупки.

Голѣма е загубата отъ снисането на такива яйца, тъй като тѣ се изяждатъ отъ птицитѣ. Единъ пжтъ птицата свикнала да яде подобни яйца ще почне да чупи и обикновеннитѣ яйца, а това не е въ интересъ на стопанинътъ.

Едничкото средство което може да се употреби противъ носенето на яйца безъ чурупки е даването на кокошкитѣ варовити вещества въ храната, въ случай че и това средство не помогне, тогава да се отдѣли кокошка снисаща подобни яйца.

Червей въ яйцето — Вследствие на паразити намиращи се въ червата може да попадне единъ отъ тѣхъ при изхвлянето му въ клоаката и отъ тамъ въ половиятъ оргнъ и преди още образуването на дветѣ подчерупечни ципи червеятъ бива обвитъ отъ белтъкътъ на яйцето.

Яйце безъ желтъкъ — Често пжти жлезитѣ отдѣлящи белтъчнитѣ вещества биватъ възбудени отъ неизвестни причини и отлжгватъ излишенъ белтъкъ, които се привежда въ движение около себе си и по нататкъ се продължава образуването на яйцето, често се случватъ подобни яйца безъ чурупки и съ една голѣмина колкото лешникъ.

Яйце имащо кърваво петно — При отдѣлянето на яйцето отъ яйчникътъ често се случва да се скъса ципата обвиваща го и крепяща го за яйчникътъ, на това мѣсто кждето обвиващата ципа е по изобилна съ артериики. По тоя начинъ желтъкъ бива настигнатъ въ своя пжтъ отъ капка кръвъ паднала отъ артерийката и така при счупването на яйцето често пжти прави впечатление кървавото петно и се взема отъ нѣкой като яйце, което е било мѣтено известно време.

Двойни яйца — Подъ двойни яйца ще се разбира такива които включватъ въ себе си второ яйце, образуването имъ се обяснява по следниятъ начинъ: следъ като се е обвило яйцето съ дветѣ си подчерупечни ципи бива настигнато отъ белтъкъ отлжченъ отъ белтъчнитѣ жлезе вследствие голѣмата имъ активностъ дължаща се често на храни богати съ белтъчни вещества, тоя белтъкъ се наслоява отново върху яйцето и образува новъ пластъ върху ципитѣ, следъ това новиятъ пластъ белтъка бива покритъ отъ черупката.

Малки яйца — Наблюдаватъ се често малки яйца чийто съдържание е нормално, такива яйца се снасятъ когато липсва вода или отъ преждевременото пронисване на ярката, дължащо се на изобилната храна.

По некой пжтъ се опредѣлятъ като ненормални яйца и и тия които иматъ въздушната си стаичка на една отъ страничнитѣ стени на яйцето.

Отъ прочитането на статията на всеки единъ става ясно причинитѣ и начина на образуването на ненормалнитѣ яйца а не тъй както се рисува въ народното въображение.

Херманъ Дитрихъ.

(Министър на Райха на прехран.
и земледѣлието)

Нови пѣтища въ птицевъдството и яйчарството.

Птицевъдството играеше преди войната второстепенна роль въ Германия. Селянина се ограничаваше предимно да получи яйца за собствено употребление. Едва поукитѣ извлечени отъ войната и следъ нея дадоха тласъка за едно планомерно птицевъдство и развъждане на домашни птици.

Наличността на птицитѣ въ Германия при народното преброяване отъ 1 декември 1927 година показва около 71 милиона броя домашни птици, което число се увеличи презъ 1928 година на общо 75¹/₂ милиона птици отъ които 62 милиона *носачки*, така че на всѣки жителъ въ Германия се пада по *една носачка*, като въ Америка напимѣръ на всѣки жителъ се падатъ около *шестъ носачки* и въ Холандия *три*. Наличността на кокошкитѣ въ Германия далечъ не достига и покрива нуждитѣ. Презъ 1927 година, внесохме при това положение 27 милиярда и презъ 1928 година крѣгло 3 милиярда броя яйца. По стойностъ вноса е възлизалъ презъ 1913 година 188 мил. марки, 1927 год. 275·8, а 1928 година се покачилъ на крѣгло 300 мил. марки. Кѣмъ тия числа трѣбва да се прибавятъ и близо 100 мил. за произведения отъ птици (съ изключение на яйцата).

Причината за голѣмия вносъ на яйца лежи въ минималната носливостъ на нашитѣ кокошки, която носливостъ възлиза на крѣгло 80 яйца въ година, докато тази въ Дания е 150 броя. Развитието на обстоятелствата докараха работитѣ до тамъ, че следъ войната има едно търсене на яйца въ качествено отношение.

Нашето планомерно *изтиквање* на чуждестранната конкуренция отъ нашитѣ пазари е само тогава възможно, ако сполучиме да създадемъ едно еднообразно, признато германско яйце и то да можемъ да го дадемъ въ изобилие на пазаря. За да се постигне това, преди всичко трѣбва да се подобри производството, да се централизира то и да се прилага рационално, които неща сж предисловие.

На полето на птицевъдството, като първа задача, трѣбва да се заменятъ досегашнитѣ породи съ носливи такива. На първо место трѣбва да се насочи влиянието върху средното и дребното земледѣлско население, което има въ рѣцетѣ си близо 80% отъ общото птицевъдство. Покрай обстойно поясняване и осветление върху изискванията при птице-

въдството, особено при развъждането на породисти крилати животни и избора на породата, трѣбва да се строятъ курници, устройството имъ, храната на птицитѣ и пр. да се обсъди също, ще трѣбва да поощрятъ кооперативнитѣ заченки и кооперативното набавяне на инкубатори, майки, хранителни средства и пр., а отъ друга страна трѣбва да се търси добрия пазаръ-пласиментъ на яйцата и птицитѣ. Освенъ това трѣбва да се укаже и силното влияние върху болеститѣ на птицитѣ и борбата срещу тѣхъ, които представляватъ особена опасностъ за съществуването и по-нататъшното развитие на птицитѣ.

Къмъ една отъ длъжноститѣ и задълженията на окръжитѣ се числи и насърдението на птицевъдството. Въ държавния извънреденъ бюджетъ се определи сумата отъ *единъ милионъ марки* за насърчение на птицевъдството и намиране добъръ пласиментъ на неговитѣ произведения. Отъ горния милионъ 500 хиляди марки бѣха опредѣлени за помощи и 500 хиляди марки за поефтиняване на лихвитѣ. Тия помощи до стотинка бѣха раздадени. Отъ сумата за поефтиняване на лихвитѣ има една незначителна сума свободна. Тия средства се похарчиха по нареждане на комисия отъ Райха и министерския съветъ, които опредѣлиха тѣхнитѣ цели, а именно:

1. За насърчение на породисти птици съ носливостъ.
2. За помагане въ кооперативно набавяне на инкубаторе и майки.
3. За насърчение на угоителнитѣ стопанства, които угояватъ предимно германски слаби домашни птици,
4. За поддръжка на опитнитѣ и учебни станции, за стопанско птицевъдство и съвещателни станции по птицевъдството и
5. За организиране на борба противъ болеститѣ на домашнитѣ птици.

При организирането на пласимента на яйца, не може въ Германия да се прилагатъ досущъ примѣритѣ отъ другитѣ страни въ които страни износа на яйца играе значителна роль, а трѣбва на първо мѣсто да се има за най-важна цель *превземането на вътрешния пазаръ*.

За достигане на тази цель съществуватъ две мнения, които сж особено отъ значение, а именно:

Качествена сортировка въ однородностъ и централизация на предлаганията. Едно значително подпомагане и упжтване по отношение уеднаквяване качественоста може да се очаква чрезъ прекарването на литературната рата — упжтвания за германското пресно яйце издадено отъ Германския стопански съвѣтъ съ съдействието на стопанскитѣ Търговски камари отъ окръжитѣ и околитѣ, така и на компетентната браншова организация, които упжтвания да служатъ въ цѣ-

лата държава. Покрай настояването на печата гарантиращ качеството на стоката и еднаквото сортиране по тегло, така и еднаква опаковка, ще улеснят пласирането ѝ.

Централизацията на предлаганията е уместна и нужна, за да се дадат стоките въ купъ на консумативните места въ всички по-голям консумативен център, и за това тамъ ще трѣбва да има — борси на яйца съ образцово търговско смѣтководство и съдействие на респективната организация. Тия централни продажни кантори, трѣбва да обхващат падащите въ тѣхния бранш клонове. Тия централни продажни кантори трѣбва да почиват на здрави основи. Създаването на двадесетъ такива централни организации въ цѣла Германия е въ проектъ.

За насърчение на организацията по продажба на яйцата е предвиденъ въ извънредния бюджетъ на земледѣлието 3 милиона марки, отъ които 1,750,000 марки за помощи и 1,250,000 марки за поефтиняване на лихвите.

Отъ тия средства сж дадени до сега 1,300,000 марки за помощи и около 300,000 марки за намаление на лихвите.

Организации за централизирано продаване могатъ да се ползватъ съ държавните помощи, само които сж отъ значение т. е. сж голѣми и добре развити. Изплащането на средствата ставаше до сега сравнително бавно, защото липсваха правилата.

Средствата се даваха предимно на стабилни и работоспособни организации. Условия на такива бѣха съразмѣрните гаранционни суми опредѣлящи минимални годишни обороти и признати доказателства за създаване на „германското пресно яйце“, и преди всичко организиране на срочното доставяне. Оборотния капиталъ трѣбва да си набавятъ сами продажните сдружения на яйца. Улеснения представляватъ въ случая помоща на дадена съ парични средства за поефтиняване лихвата. Помощите ще служатъ за учредяването на сдружени покупни станции, както и за набавянето на инвентара (ламби, опаковаченъ материалъ, амбалажъ, складове, фриго, разпродажни хали и пр.).

За да се усигури едно по-свързано централизиране на продажбите въ по-големите консумативни центрове и да се отбегне същевременно *взаимната конкуренция*, ще трѣбва да се създадатъ близки станции. Такива сж предвидени за Берлинъ и Рурската областъ. Продажбата ще трѣбва да става само на потребителните кооперации, голѣмите стокови магазини предимно на ангросистите. Изобщо да се стреми едно разумно разпределение на работата, като се представи на селяка и птицевѣда производството на земледѣлските сдружения събирането и обработката, а на ангросистите и деталистите продажбата на консуматора.

Необходимо е и крайно нужно въ следующите нѣкол-

ко години, да се дава нуждната помощ на птицевъдството и яйчарството.

Чрезъ издигането на до сега слабо развитото, обаче имащи здрави основи и изгледи на успѣхъ птицевъдство ще се успѣе, не само да се помогне на консуматора, но и ще се допринесе на Държавния търговски балансъ и подобри положението и състоянието на среднитѣ, дребнитѣ и най-дребнитѣ земледѣлски стопанства, така че ще се води една разумна селска стопанска политика.

Изъ „Айеръ—Бьорсе“

Съобщава Ж. Л.

За носливостта на птицитѣ въ Централната опитна станция — София.

Таблица за носливостта отъ 1. I. 1929 год. до 31. V. с. г. на расовитѣ и мѣстнитѣ кокошки при Централната Опитна Станция — София.

Фактически тази таблица изразява носливостта за последнитѣ три месеци: мартъ, априлъ и май, тъй като презъ месецитѣ януарий и февруарий поради голѣмитѣ необикновени студове кокошкитѣ общо взето сж снесали много слабо.

№ по редъ	РАСА	Брой на носачкитѣ	Средна носливост за 5 м.	Минимална носливост	Максимална носливост
1	Легхорнъ	27	59	40	83
2	Минорка	16	56	43	76
3	Редъ-Айландъ	17	53	41	71
4	Плимутъ-Рокъ	32	50	38	65
5	Виандотъ	18	41	32	55
6	Черна мѣстна	32	52	45	65
7	Бѣла „	18	50	44	64
8	Жълта „	20	48	37	67

Платете си абонамента или запишете 4 нови абонати за да Ви се изпраща списанието даромъ!

Съюзенъ и кооперативенъ животъ.

БЪЛГАРСКИ ПТИЦЕВЪДЕНЪ

СЪЮЗЪ — СОФИЯ.

ул. „Левски“ № 8

До Птицевъднитѣ дру-

жества и клубове въ страната.

ОКРЖЖНО № 2

Съобщава се на членоветѣ на съюза за знание и изпълнение:

1. Всички Д-ва да се абониратъ за съюзното списание, за да могатъ да следятъ нарежданията на У. С.

2. Всички не издължили се къмъ съюзната каса Д-ва — имената на които сж публикувани въ настоящия брой, да се издължатъ най-късно до 15 юлий н. г. Ония д-ва, които не сторятъ това, ще се считатъ напуснали съюза.

Дружествата трѣбва да разбератъ, че съюза се издържа само отъ тия вноски и, че следователно безъ да бждатъ тѣ редовно плащани, съюзъ не може да съществува. Членството въ съюза предполага и дава безпорно известни облаги и права, на сжщо и известни задължения, които ако не се изпълняватъ, не може да се претендира за права и блага.

За напредъ У. С. ще изпраща безплатнитѣ си издания и ще се грижи само за ония д-ва, които сж редовни. Ония които не сж редовни и смѣтатъ, че не е нужно да изпълнятъ материалнитѣ си задължения къмъ съюза, не могатъ да иматъ морално право, нито да се интересуватъ отъ неговия животъ (за конгреситѣ), нито да търсятъ услугитѣ му.

Нека се запомни, че на следния конгресъ не ще се допуснатъ делегати нито на едно неиздължило се Д-во.

3. За напредъ нѣма да се утвърдява нито единъ уставъ нито ще се приема д-во въ съюза безъ да е внесло членския си вносъ заедно съ устава и учредителния си протоколъ.

4. Всички д-ва да изпратятъ точния списъкъ на редовнитѣ си членове и се издължаватъ съобразно съ тоя списъкъ.

5. Всички д-ва да следятъ най-ревностно за появата на болести по птицитѣ въ районитѣ си и да съобщаватъ, освенъ на ветеринарната власть въ районитѣ си, но и на съюза за да вземе и той отъ своя страна мѣрки.

София, 8 юни 1929 г.

Председатлъ: Проф. Г. С. Хлѣбаровъ.

Секретарь: Хр. Иринчевъ.

Пернишко Птицевъдно Д-во.

На общото си годишно събрание избра съ пълно еднородушие следния управ. и контрол. съвети.

Упр. съветъ: пред. Инж. Георги Коняровъ, подпред. Богданъ П. Бояджиевъ, секр. Георги Н. Трънски, касиеръ Сава Христовъ, членове Инж. Игнатовъ. Контролна комисия: Владо Стояновъ, Инж. Кефаловъ, Любенъ Георгиевъ.

Д-во „Птица“ въ София.

На годишното събрание 29 избра за управителенъ съветъ: пред. Б. Руменовъ, подпред. Ив. Цанковъ, секретаръ П. Шоповъ, членове: Хр. Пенчевъ, Б. Атанасовъ и П. Казанджиевъ и касиеръ Ил. Тончевъ.

Ямболски птицевъденъ клубъ.

Новия съставъ е следния: пред. Ив. Даевъ, подпр. Асенъ Сжбевъ, и секр. Тод. Костадиновъ, контр. комисия: Ник. Илиевъ и Щилианъ Цоневъ.

Приети въ съюза Д-ва.

Управ. съветъ на Българския Птицевъденъ Съюзъ прие въ заседанието си на 30/XI 1928 год. съ протоколъ № 13.

1. **Шуменското Д-во** пред. Д-ръ Борисъ Геровъ, подпр. Ст. Енчевъ, секр.-касиеръ Ст. Дучевъ.

Приети съ протоколъ № 18 отъ 21 I. 1929 год.

2. **с. Заветъ — Разградско.** Пред. С. Стамболиевъ, подпредседателъ С. Гошевъ, секр.-касиеръ Ст. Куновъ.

3. **Сливенъ.** А. К. Бояновъ.

4. **Кара-Ачъ — Русенско.** Председ. П. Кондевъ, подпр. П. Стойчевъ, секр.-касиеръ М. Найденовъ.

5. **Самоковъ.** Пред. Г. Кыосевъ, секр.-касиеръ Т. Раковски.

Приети съ протоколъ № 22 отъ 11. III. 1929 год.

6. **Брацигово.** Пред. Г. Гуламетовъ, секр.-кас. Т. Тасевъ.

7. **Ямболъ.** Пред. Ив. Даевъ, подпр. А. Сжбевъ, секрет.-касиеръ Н. Илиевъ.

8. **Берковица.** Пред. Н. Шишковъ, подпр. Ст. Кавлаковъ. касиеръ Н. Пиперковъ.

9. **Козлодуй.** Пред. П. Кефсизовъ, подпр. Д-ръ В. Владовъ, секр.-касиеръ Т. Тодоровъ.

Приети съ протоколъ № 3 отъ 22. IV. 1929 год.

10. **Севлиево.** Пред. И. Монева, секр.-кас. Л. Данчевъ.

(Следва)