

то червиноква и пѣна. Та произхожда отъ пидорж на кръвъта, отъ гниене на жила-ты, и артерий-ты на лека, на гърло-то, и грацѣла, причиняемо отъ плеврита, или перипневмонийъ, или и крохитъ, или отъ прѣстаиѣ на мѣсачины-ты, или Еморонды-ты, и отъ смѣщеніе-то на дѣша-та, ирѣчь отъ анкова, печаль, радость и проч. за това докторъ тѣ трѣба да положи тѣка най-големо-то си вниманіе, защото-то мажно ицѣлава коного, по-вече-то дѣвоки-ти и носозаплатници ти (кыраджин-ти) и ученици-ти са овладаватъ отъ тѣжъ конѣсть.

Раздѣлавага на мощиж и на немощиж, на остъръ и на хроническж, на изцѣлимж и и смъртоноиж, Та ако бы да не са прѣдваря, приносѣ пневмоническж-тж (ликовж-тж) чехотиж и полмонейж-тж, то естъ цыреѣ на лека, казва Инократъ, какъ, «кон-то панижтж кръвъ пѣнаж, е извѣстно, какъ тѣ излаза отъ лека (бѣлаш-тж джигерь), и ако на това послѣдова паятїе-то на гной е лошъ знакъ, и ако са заире гной-тж случавага смърть.» » Яфор. 217. кон-то панижтж кръвъ, по-вече-то умирятъ ако не са прѣдварятъ.

Ползѣва на емпотийж-тж кръвопѣканїе-то, иронъ-тж за кръвопаятїе-то 588, дикото-то 645, стнотичеко-то смѣшенїе 717, питїе-то 782, магнезіѣ-та 809, прѣхъ-тж 825, прахъ-тж на Доверъ 855, тисана-та 860, пилан-ти на Елацио 874, дигитале 1091, и Исландійскій-тж лѣхенъ 1142, коприва-та 1128, корень-тж на ретанїѣ, и маѣко-то отъ магарѣж.

§. 22.	{	Невъздържанїе на мочка-та,	Бл.
		Ἐκράτεια τοῦ οὐροῦ,	Гр.
		Инконтиненца дѣла урина,	Ит.
		Идрѣхъ тѣтѣмака,	Тѣр.

Тѣжъ болѣсть случавага отъ раны-ты на стагатель-ты на кнѣта-та, или отъ нѣхно разслакленїе и на киста-та, или отъ пизѣз нѣнѣж и отъ кандариды-ты. Мочка-та капи капка по капкж, или са измыва акїе вѣчка-та, и киста-та са умалава по лѣка-лѣка.

устъ-тж, отъ гърло-то и гортана (*φαρυγγα*) и отъ стомаха, на вртѣмани са нахождатъ и пѣвници залѣпени на гортана, и болнѣйтъ са уплашва, докторъ-тж обаче трѣба да изслѣдова добръ страдающаго съ вниманїе.