

Много блѣваніе (жѣланіе) происходитъ отъ припаданіе на жѣлѣдка, отъ много злѣчь, отъ нагнѣванія, отъ неща что поддѣгatz, отъ еметическы лѣкарства, отъ колѣтіе и скръз на жѣлѣдока отъ колѣть наіаконз, отъ мѹхопанты и отравы; отъ много-то блѣваніе дохоща и смръть-та.

На много-то блѣваніе ползѹва питіе-то каламанте 780, и питіе-то 785, стиптическій-тѣ прахъ 801, тисана-та 851, варо-ба-та вода 901, спиртъ-тѣ на бобра 911, течно-то анодно, анитово-то сѣмѣ (анасонъ тѣхлѹмѹ) 1074, идіозмиз-тѣ 1105, и масло-то мѹ, филандрѣо-то водно 1195, корень-тѣ коломбовъ 1151, и кисложелато-то на потага-та, и визникаторъ-тѣ на жѣлѣдока, и абіе прѣстава блѣваніе-то.

§. 102.	{	Блѣваніе и жѣланіе на дѣца-та,	Бзл.
		<i>Ἐμετός καὶ Ἀβζύρος τῶν βρεφῶν</i>	Гр.
		Вѣмито ѣсингіоцо,	Ит.
		Кай ве ѣнскирикз,	Тѣр.

Здравн-ти дѣца рѣдко блѣватъ, кон-то ѣж нездравн обаче блѣватъ часто, и това происходитъ отъ лѣннѣнж-тѣ нмиз матеріѣж, или сополнѣж, кон-то ѣа нахождатъ въ устѣж-тѣ нмиз и стомаха нмиз, отъ кон-то происходитъ жѣланіе-то, безвѣніе-то, блѣнове-ти, и колика (санджн).

За да ѣа нцѣлѣжтѣ трѣба да взематъ мало сладко вино ѣ сахаръ, или сиропахъ-тѣ віоле-то (мленекѣ-то) 1108, или реоваркара 124, или мана-та (кодретъ халваси) или миндалово-то масло, или магнѣзіѣж-тѣ по добрѣ. (*).

§. 103.	{	Ѣмпіема,	Бзл.
		<i>Ἐμπύημα,</i>	Гр.
		Ѣмпіема,	Ит.
			Тѣр.

Ѣмпіема-та ѣ цырей нѣкой пѣленѣ ѣ гной междѹ лѣка и дорѣка. Страдатель-тѣ ошѣща трѣднодыханіе и взлѣнованіе на гноѣ въ

(*) На много дѣца понеже ѣа нахожда много гастрическа кнѣслота въ жѣлѣдока ѣжѣстава ѣа тамошно-то млѣко и така го блѣватъ на сыреніе.