

Таа болѣсть са глѣчава многажды нечаинно на чеюѣческій-тѣ стомаѣ из болѣніа вѣрлы и страшны, отъ настиваніа, смѣшеніа и залѣмлены пиши. Таа е вредителна, многажды опасна и смертоносна; на конѣ-то сж подлежащи ногоболин-ти, нѣтиречики-ти, и ипохондрически-ти.

Ищѣлѣваса из антиспазмодическы-ты лѣкарства, из үмагичи-телны-ты пареніа на желудока, из анодинаж-тѣ капкѣ 841, из плавиць-ты и визикатора, из анодинны-ты камы и анодинны-ты лѣкарства.

§ 165.	Ракъ на чѣвла-та,	Бзл.
	Кархіос тәу өгтѣрәү,	Гр.
	Кангро дѣлә интестини,	Ит.

Ракъ-тѣ на чѣвла-та не є друго, огѣнь єдно вѣснalenіе нижно, кое-то складка всичкѣ-тѣ утробж, или единънейш часть. Той наѣ на-прѣда е спокойнѣ и не огѣща страдатель-тѣ, колкото замнѣнѣа окаче огѣща болѣніа зѣлии, найпаче кога натисне нѣкой с-мижъ странж; на тѣжъ болѣсть глѣчаваса коністнапціж, и ако и-злѣзатъ матеріи, и злазатъ вонеци, или үкрававени, утроба-та га прѣставлѣва издадена на вѣз.

Ищѣлѣваса тоа ракъ из исты ты лѣкарства на желудочный-тѣ ракъ.

§ 166.	Ракъ на нозѣ-ты,	Бзл.
	Кархіос тәу подбү,	Гр.
	Кангро дѣле гамбѣ,	Ит.
	Дакъ гаратанъ,	Т8р.

Ракъ-тѣ на нозѣ-ты не є друго, развѣ единъ спазмъ, или вѣз-ѣданіе на мышцы-ты (жевы-ты), или на нервы-ты, кое-то га глѣчава на берца-та на нозѣ-ты, и на пѣсты-ты имъ. Пронхожда отъ стриканіе или измѣстаніе на мышцы-ты, или на вѣзлы-ты, и отъ атоніїк на тѣло-то.

Ищѣлѣваса таа болѣсть като са стиска и разтрыва из ржкѣ, иѣ на-право на дзлжніх, но-нолѣрато, или са съврѣзва тѣ страна сиано; страдатель-тѣ влаза до 15 дны вѣ топлы-ты бани 694, и като излаза трые и може болиж тѣ часть из антиспазмо-дическѣ-тѣ мазь 486; при вѣ това многажды мѣсто-то оставед истрѣжнало.