

Познаніе. Чрева-та въ прѣдѣлѣ тѣхъ иматъ единъ цыпж, коѧ то гы кырзка быш-ты бѣдно. Въ тѣхъ цыпж сѫ разпрѣшилти кички-ти хилоногии и малѣконоси и скажди, конъ то иматъ основы-ты въ чрева-та, и кырхове-ты въ общи-тѣхъ иихенъ водитель. (Виждь Анатомік-тѣ томъ 2-ый и картк-тѣ й). Таѣ цыпа кога сѫ воспален, тогака сѧ нарыча *Месентеритъ*.

Причини. Той проиходжа отъ обшо то воспаленіе на чрева-та, или пробыканія, или прирѣзканія въ отравы.

Характеръ. Раздѣллясѧ на мошенихъ и немошенихъ, на частенъ и обшъ, на проста и сложна, кой-то саѣда врѣмѧ докарба дѣ-реjk-тѣ, скроеваніе-то на гланзы-ны, и чехотка-тѣ наихъ.

Исцѣленіе. Ползъва на месентерита кръвопусканіе-то, пѣ-вици-ти на афедрона, и катапаазми ти 656, и визикаторѣ-тѣ, гы-ромлѣко-то 886, сѣфа-та тисана 649, разхладителна та кашка 708, разрѣшилтелна-та пара на утроба-тѣ 509, и умагчителна-та кашма 674, учищеніе то отъ манижъ 677, миндалово-то мад-ело 1072. Яко болѣсть-та стане рана, везма єдна чаша матѣко скединено съ дѣѣ чисты декото калгамическо 645, везма и вали-само-то Лѣкательово 518, или матѣко сѧ кина 1125, и съ мало-течно анодино 918.

§. 228.	<i>Минингитъ,</i>	Бзл.
	<i>Мүкүүгүлсө,</i>	Гр.
	<i>Минингитиде,</i>	Ит.

Познаніе. *Минингитъ* сѧ нарыча воспаленіе-то на минин-гы-ты на глава-та, сирѣчь на мозачны-ты цыпы; таѣ цыпа є пажановидна оболочка, коѧ то обѣкка мозака, отъ прѣдѣлъ и отъ зада и хребетный-тѣ мозакъ, нарычасѧ пажана цыпа, зачто-то прилича сѧ такань-та на пажака.

Характеръ. Таѣ болѣсть на глава-та є остра и хроническая мѣстна и обща, мощна и немощна, ищѣлима и неишѣлима сирѣчь гыртоносна. Той сѧ лошо-то ищѣлие може да докара енгѣфалита, кефалеj-тѣ, маниj-тѣ и гырть-тѣ. Кой-то страдає има чѣрвенінж на лице-то, гладоболіе, поддиганіе, блюваніе, безсилие и зѣркніе-то, краткорѣчіе, огнь, многажды и спазмы.

Причини. Причини-ти на болѣсть таѣ сѫ вникашки-ти напа-