

стна и обща, проста и сложна, комъ-то съ време може да принеси атоній-тъ и смърть-тъ.

Такъ изображава ксано, и кога е сама, забавява, и докарва безпокойствіе и болѣніе. Утробата на страдателя вижда ся тогава утекла на килик напрѣдъ, и изчудена нареди. Пажътъ мъ е мало потживъл, на времеши излази и на близъ.

Такъ вода съ находиа между чрева-та и перитоне-то комъ-то като съ събере до двадесѧть оки, трубо съ ищѣлажа съ лѣкарства, разбѣ съ пробожданіе-то, и съ ганго-то сънливаніе.

Индѣленіе. Ищѣлажа идропикія-та такъ съ неты-ты лѣкарства на прочин-ты идропики (вижди Акнитъ §. 54) (*).

§. 554.	Идродораксъ,	Бзл.
	Удроѳѣраѣ,	Гр.
	Идротораце,	Ит.
	И.тиканъ садълъ,	Тѣр.

Познаніе. Зовига идродоракса идропикія-та на доракса и на гржди-ты на человѣческо-то тѣло. Такъ идропикія трубо съ познава въ начало-то си, страдатель-ти окаче вигда пїе водъ мнозо. Принадлежи-ти, конъ-то иж представляватъ, съ едно идиматодно подъзваніе въ астралы-ты и тарти на ногы-ты, на брѣмени съ глъчава и надъ рѣцѣ-ты. Страдатель-ти огѣша едно насилованіе въ начало-то на стомаха, причиняю отъ воды-ты что съ тамъ, конъ-то кога онъ стои правъ, паджта въ діафрагмѫ-тъ мъ. Той чвѣтъ едно трубнодышаніе и принадланіе, вѣнія на грудете, и съхъ кашлицъ, съѣдъ рѣчока; лице-то мъ съ вижда жъльто и по-дѣто, пулъзъ-тъ мъ е слабъ, кожа-та мъ стъдена съ анасаркъ, и съ слабостъ на дѣйствителы-ты мъ силы.

Причини. Причини-ти, конъ-то докарвяжъ идродоракса съ ити-ти на дѣгъ-ты идропики; при все това трубо съ познаватъ причини-ти мъ.

Характеръ. Раздѣлажа идродораксъ-тъ на мощнѣ и немощенѣ, на мѣстенѣ и обща, на ищѣлажи и смъртоносенї.

Прѣдпознаніе. Погаѣствія-та на тѣмъ болѣсть съ и-

(*) На висы-ты почти идропики ползвка гомагота-та.