

Два вида е има идрокила первый-тъ е кога вода-та влаза въ величскъ-тъ ткань на кожъ-тъ на мидѣ-ты, кое-то е слѣдѣва, кога кожа-та отъ възъ е жьлта, подѣта, стѣдена, и лизкава; второй-тъ проихождѣ отъ разлываніе-то на воды-ты въ положни-цы-ты на едно-то, или на друго-то отъ мидѣ-ты; и това е разпознава отъ улгкчаваніе-то на подѣваніе-то, кое-то забивко-ва мидо-то.

Причини. Причини-ти на тѣхъ болѣсти е почти исти-ти ех на другы-ты идрокии; при това ех и удареніѣ-та, и францѣз-ски-ти болѣсти.

Характеръ. Раздѣлаваа идрокила-та на мощиъ и немощиъ, на остръ и хроническъ, на простъ и сложенъ. Отъ идрокла тѣ многожды е слѣдѣва, саркокила-та, възпаленіе-то, скръ-тъ, и ган-грена-та.

Исцѣленіе. Исцѣлаваа прѣвый-тъ видъ из проиваніе-то (и изиваніе-то на воды-ты, и абіе трѣба да вѣри хирѣргъ-тъ чрѣзъ нѣкожъ фокіъ вѣтрѣ имъ мало вино (иано и хладко; послѣ пол-зѣвѣтъ още и лѣкарства-та за анаскръ-тъ, налага топлы лапы отъ лѣшъ и черъ вокъ (бакъ) из оцетъ, или манданоза, или да-финно-то магло, или мокри стѣпн из силнъ винахъ шпиртъ и гы полага отгорѣ. Второй-тъ видъ рѣдко е исцѣлава из идрагоги-чески-ты лѣкарства; парисъ обаче отъ възъ из пареніе-то 307, взема и отвѣтрѣ болный-тъ идрагогический-тъ прахъ 811, птеле-нъ-тъ 1169, стѣва и проиваніе-то спорѣдъ хѣдожество-то и и-скуство-то.

§ 355.	{	Идроминингіокіла,	Бѣл.
		Идромигигіохіла,	Гр.
		Идроминингіокіла,	Ит.

Познаніе. Казваа така таа идрокіла, зашто то таа во-да е слѣдѣва междѣ мозака и минингы-ты. Та е познава отъ подѣваніе-то на тѣло-то и клѣпкы-ты, и отъ многоизніе-то.

Характеръ. Раздѣлаваа та на простъ и сложенъ, на мо-щиъ и немощиъ, на остръ и хроническъ.

Исцѣленіе. Исцѣленіе-то е исто-то ех на идрокифала. Трѣба страдатель-тъ да покрѣва главъ-тъ си из платна намокренъ въ