

жъе само дѣѣ годинъ, посль изг҃ухна; ииине днѣо около вады-тѣй (адѣахас) краї 18лїа мѣсяца; корени-ти на това растѣніе сж дѣїти и клонягти, и чрыникави отъ ванз, изъ аного коренче-та дѣѣвны; стебло-то мѣа возвышава до 3 или 5 ноги (дѣїмы) и то е травено (хортѣвле), отъ вактреѣ праизно, листви-ти имѣтъ единовозрастни лѣжаши, тѣс сж двокрылни, широки, трилобин, зажассты, изъ краснѣ тѣмназѣленіе; тѣс сж почти подобин на кервица пытобный что го адѣтъ человѣци-ти.

Цѣѣтве-ти имѣтъ лѣжатъ на врѣховеты на стебла-та и клонове (вѣтви), въ видѣ на зонтицы (омбрелы), множествени, вѣли, и лѣчести (актиогата), плодове-ти имѣтъ малки и чрыникави. Всичко-то растѣніе имѣтъ уханіе насладително, и вкусъ горчицъ, и теплодроматенъ; употребляемъ въ медицинѣ-тѣ влечк-тѣ тракж.

Сила. Укрепително и затопително.

Употребленіе. На вѣздѣшины-ты колики, на непищеваренія-та и слабость на вактреѣности-ты.

Доз. По др. 3 до 8 въ вѣблѣ водж др. 100 за да стане декото (хѣдѣахаса) за всѣ день.

Задѣл. Декатъ видове ангелика сѫществува: 1. пинкви-та ангелика, 2. дика-та, 3. голѣма-та, 4. блестатѣла-та, 5. горска-та, 6. гидрофилъ тѣ, 7. агреворфирина-та, 8. Апайска-та, 9. Скотѣйска-та.

{ Ядіандо трилобин, Бл. *Adianthus Tellae*, Бл.
Полуцѣплюг, Простогр. Ядіандъмъ Капілъскъ вѣнерис, Л.
Капілъера Фр. Капелъ венерѣ, Ит. Балдинъ Карад- Тѣр.

Классъ 24 Тайоженіе. Чинъ 1. Птерисъ.

Виждь фиг. 2 въ 1-ый Томъ на реченик-тѣ Ботаникъ.

§. 1059. Ядіандо-то е растѣніе многоживно отъ рода на полиподны-ты птеры, то ииине околъ үстж-тѣ на кладенцы-ты, и изборы-ты, мноваждына находда и въ влажны-ты мѣста на плавнины-ты и видове на развалини; корени-ти мѣа сж паразитини и чрыни; отъ корены-ты излазиѣтъ много когловидни филизи, танки, чрыни, и блестателни; листви-ти имѣтъ гладки, танки, изъ трилобин, тѣс сж почти прозрачни, и са дѣїжатъ отъ корила дѣїги, блестателни и вѣды, плодове-ти имѣтъ лѣжатъ отъ додѣлисты-